

EFFINOL Solución *Spot-on* para Perros

Solución *spot-on* para perros

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución para unción dorsal puntual (Sol.u.d.p.)

Composición por ml:

Sustancia activa: Fipronilo 100 mg.

Excipientes: Butilhidroxianisol (E-320) 0,200 mg; butilhidroxitolueno (E-321) 0,100 mg; alcohol bencílico (E-1519) 285 mg.

Propiedades farmacológicas

Grupo farmacoterapéutico: Ectoparasiticidas para uso tópico, incluyendo los insecticidas.

Código ATCvet: QP53AX15.

El fipronilo es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. Actúa inhibiendo el complejo GABA, uniéndose al canal de cloro y bloqueando así pues la transferencia pre- y postsináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares. Esto genera una actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos o ácaros.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*) en perros como parte de la estrategia de tratamiento contra la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP), cuando esta se haya diagnosticado previamente por el veterinario responsable. La eficacia insecticida contra nuevas infestaciones por pulgas adultas dura hasta 5 semanas.

El medicamento veterinario protege contra nuevas infestaciones de garrapatas (*Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*) en perros desde la semana 1 hasta la semana 4 tras la aplicación del medicamento veterinario.

Contraindicaciones

- En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros menores de 12 semanas de edad y/o que pesen menos de 5 kg.
- No usar en animales enfermos (p. ej., enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.
- No usar en conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento e incluso la muerte.
- Este medicamento veterinario se ha desarrollado específicamente para perros. No administrar a gatos, dado que podría provocarse una sobredosificación.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame, puede observarse un periodo breve de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- Entre las reacciones adversas sospechosas extremadamente raras, se han observado reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación (decoloración de la piel, alopecia local, prurito, eritema) y prurito o alopecia general.
- En casos excepcionales, se observaron hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos), vómitos o signos respiratorios después del uso.
- No sobredosificar.

Vía de administración

Tópica en la piel.

Posología

Perros:

1 pipeta de 0,67 ml por perro con peso superior a 5 kg y hasta 10 kg peso corporal.

1 pipeta de 1,34 ml por perro con peso superior a 10 kg y hasta 20 kg peso corporal.

1 pipeta de 2,68 ml por perro con peso superior a 20 kg y hasta 40 kg peso corporal.

1 pipeta de 4,02 ml por perro con peso superior a 40 kg y hasta 60 kg peso corporal.

Esto corresponde a la dosis mínima recomendada de 6,7 mg fipronilo/kg peso corporal.

- En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas.

Precauciones especiales

Precauciones especiales para su uso en animales:

- Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplique en una zona donde el animal no pueda lamer el medicamento veterinario y asegurarse de que los animales no se puedan lamer unos a otros después del tratamiento.
- Solo para uso externo.
- Los animales deben pesarse con precisión antes del tratamiento.
- No se ha documentado la toxicidad potencial del medicamento veterinario en cachorros de menos de 12 semanas de edad que están en contacto con la madre tratada. Por lo que se debe tener precaución especial en estos casos.
- No aplicar el medicamento veterinario en heridas o piel dañada.
- Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos inmediatamente con agua.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Observaciones

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Presentación

Blíster con una pipeta de 0,67 ml. Caja con 1, 2, 3, 6 y 10 blísteres de 3 pipetas de 0,67 ml. Caja con 30 blísteres de 1 pipeta de 0,67 ml.
Blíster con una pipeta de 1,34 ml. Caja con 1, 2, 3, 6 y 10 blísteres de 3 pipetas de 1,34 ml. Caja con 30 blísteres de 1 pipeta de 1,34 ml.
Blíster con una pipeta de 2,68 ml. Caja con 1, 2, 3, 6 y 10 blísteres de 3 pipetas de 2,68 ml. Caja con 30 blísteres de 1 pipeta de 2,68 ml.
Blíster con una pipeta de 4,02 ml. Caja con 1, 2, 3, 6 y 10 blísteres de 3 pipetas de 4,02 ml. Caja con 30 blísteres de 1 pipeta de 4,02 ml.

Reg. Nº

3046 ESP