

SARNACURÁN

Antiparasitario de uso externo

Laboratorio

BAYER HISPANIA, S.L.

Composición por ml:

Foxima 0,5 g.

Propiedades farmacológicas

Foxima es un ectoparasiticida organofosforado que actúa inhibiendo la colinesterasa del ganglio nervioso del parásito. La acumulación de acetilcolina en la región postsináptica interfiere con la transmisión normal del impulso en el sistema nervioso del parásito dando lugar a hiperexcitación y convulsiones seguidas de parálisis y muerte.

Sarnacurán se caracteriza por presentar una gran eficacia insecticida y acaricida y una toxicidad muy baja sobre los mamíferos.

Interacciones e incompatibilidades

- No debe administrarse conjuntamente con otros inhibidores de la colinesterasa.
- Los relajantes musculares del tipo succinilcolina no deben administrarse diez días antes o después del tratamiento con Sarnacurán.

Indicaciones y especies de destino

Para el control de ectoparasitosis en:

Ovino: Sarna (*Psoroptes* spp., *Sarcoptes* spp., y *Chorioptes* spp.), piojos, melófago ovino, garrapatas y larvas de moscas en las heridas.

Porcino: Sarna (*Sarcoptes* spp.) y piojos.

Perros: Sarnas demodéica (demodicosis) y sarcóptica, pulgas y garrapatas.

Contraindicaciones

- No usar en ovinos cuya leche se destine a consumo humano.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o algún excipiente.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Para uso cutáneo mediante lavado, aspersión o baño.

Posología

Porcino:

Tratamiento por aspersión o lavado.

Control de piojos y tratamiento de la sarna (infestación ligera): Se utiliza una emulsión al 0,05 % que se prepara mezclando 10 ml de Sarnacurán con 10 litros de agua.

Tratamiento de la sarna (infestación grave): Se utiliza una emulsión al 0,1 % que se prepara mezclando 10 ml de Sarnacurán con 5 litros de agua.

- En casos de infestación grave se recomienda repetir el tratamiento a los 14 días.

Ovino:

Tratamiento de la sarna por baño de inmersión: Determinar el contenido de agua del tanque de inmersión. Se utiliza una emulsión inicial al 0,05 % que se prepara mezclando 1 litro de Sarnacurán con 1000 litros de agua. Para ello mezclar previamente la cantidad de Sarnacurán requerida para el baño con 10-20 litros de agua para a continuación añadir esta mezcla al baño con agitación vigorosa y simultánea.

Reposición: Se utiliza una emulsión al 0,1 %. Añadir 200 ml de Sarnacurán por cada 100 litros de agua adicionada. Efectuar una mezcla previa como se indica en el apartado anterior.

Para el resto de indicaciones: Se puede utilizar la aspersión o el lavado a una concentración del 0,05 % que se prepara mezclando 10 ml de Sarnacurán con 10 litros de agua.

Perros:

Tratamiento por aspersión o lavado.

Control de pulgas o garrapatas: Se utiliza una emulsión al 0,05 % que se prepara mezclando 10 ml de Sarnacurán con 10 litros de agua.

Tratamiento de la sarna demodécica y sarcóptica: Se utiliza una emulsión al 0,1 % que se prepara mezclando 10 ml de Sarnacurán con 5 litros de agua. Para la demodicosis se realiza un tratamiento semanal durante 6 meses y para la sarna sarcóptica se realizan 2-3 tratamientos con intervalos de una semana. Para la aplicación local en el pabellón auricular se recomienda lavado o pulverización durante varios días.

- Para el modo de empleo, ver prospecto.

Precauciones especiales

Para la persona que administra el medicamento:

- Evítese el contacto directo del producto y la emulsión preparada con la piel y los ojos.
- En caso de contacto accidental con la piel, lávese con agua y jabón.
- En caso de contacto accidental con los ojos, lávense con agua abundante.
- Úsense guantes protectores (guantes nitrilo desechables), indumentaria de trabajo (camiseta de manga larga, pantalón largo, botas y delantal impermeable) y gafas de seguridad mientras se maneje y utilice el producto. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lávese con agua y jabón las manos, cara y piel expuestas al abandonar el área de trabajo.
- No respirar los vapores.
- Cuando se pulverice en un recinto cerrado utilice una mascarilla de protección FFP3 (protección frente a polvo fino y nieblas en base acuosa).
- Cuando se traten los animales fuera del establo, no pulverizar contra el viento.
- No pulverizar en presencia de personas no protegidas.
- En caso de padecer problemas respiratorios o si se ha presentado malestar persistente tras la manipulación de otros organofosforados, consultar con el médico antes de utilizar el producto.
- En caso de accidente o malestar, acuda al médico y muéstrele la etiqueta. Los síntomas de intoxicación por organofosforados son: Dolor de cabeza, malestar, cansancio, vómitos, trastornos visuales, dificultad respiratoria o pérdida de conciencia.

Tiempo de espera

Carne:

- Porcino: 9 días.

- Ovino: 42 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.

Modo de conservación

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 250 ml.

Frasco con 1 litro.

Reg. Nº

2374 ESP

