



Catálogo de mascotas
Chemical Ibérica



SISTEMA MÚSCULO – ESQUELÉTICO

ARTRO SENIL (Condroprotector)

100 y 300 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Glucosamina HCl 225mg. Condroitín sulfato 95 mg. Dolomita 20mg.
Ácido hialurónico 15mg. Levadura cerveza 15mg. Exto. de Cítricos 15mg.
Taraxacum officinale 6mg.
Equisetum arvense 3mg.
 L-Fenilalanina 50mg.
 Zinc (quelato aminoácidos) 1,5mg

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Cachorros y perros de razas pequeñas: 1 comp./día.
 Perros de razas medianas y grandes: 1 comp./2 veces al día hasta su completa recuperación.
 Gatos: 1/2 comp./día.



Con Ácido Hialurónico



HYALOPHYT (Giants, razas grandes, medianas y mini)



COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Colágeno hidrolizado bioasimilable, Glucosamina, Condroitín sulfato, MSM, Gamma orizanol, Ácidos grasos Omega 3, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

HYALOPHYT GIANTS:
 Perros y cachorros: 1 comp. cada 30 Kg /día.
HYALOPHYT Razas grandes:
 Perros hasta 25 Kg de peso: 1 comp./día.
 Perros de más de 25 Kg de peso: 2 comp./día.
HYALOPHYT MSM Razas medianas:
 1 comp. cada 15 K de peso /día.
HYALOPHYT MSM Razas mini:
 2 comp. cada 2-2,5 Kg de peso/día.



APARATO HEPATOBILIAR

HEPATO CHEM (Insuficiencia hepática)

60 y 300 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Cynara j(**con alto contenido en Silimarina y Cinarina**) 33 mg, Boldo 33 mg, Ortosifón 33 mg., Sorbitol 275 mg.
DL-Metionina 125 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros: 1 comprimido cada 10 Kg. de peso 2 veces al día.



HEPATO CHEM CAT (Insuficiencia hepática)

30 ml.

COMPOSICIÓN POR ML

Boldo 11 mg. Ortosifón 11 mg. Aceite de Hígado de bacalao 10 mg. Sorbitol 87,5 mg. **DL-Metionina 60 mg.**

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Gatos: Administrar 1ml/10 Kg. de peso/ 2 veces al día.



Jeringa dosificadora

HEPATO CHEM PRO (Insuficiencia hepática)

30, 60 y 90 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

DL-Metionina, Silibina y Silimarina Cynara, Boldo, Ortosifón, Vitamina E, Sorbitol, Selenio (selenito sódico).

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

HEPATO CHEM PRO 100/25:
 1 comprimido al día por cada 5 kg de peso.
HEPATO CHEM PRO 200/50:
 1 comprimido al día por cada 10 Kg de peso.
HEPATO CHEM PRO 400/100:
 1 comprimido al día por cada 20 Kg de peso.
HEPATO CHEM PRO 40/10 Razas mini:
 1 comprimido al día por cada 2-2,5 Kg de peso.



HEPATO CHEM PRO CAT (Insuficiencia hepática)

30 ml.

COMPOSICIÓN POR ML

Cynara Boldo Ortosifón. Sorbitol 70 mg. DL-Metionina.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Gatos: 1 ml /5 Kg. de peso /2 veces al día.



Jeringa dosificadora

APARATO URINARIO

URO CHEM (Insuficiencia renal)

60 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Lespedeza (Exto. seco) 90 mg. Cynara 80 mg. Ortosifón 50 mg. Sorbitol 210mg

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros: 1 comprimido por cada 6 Kg. de peso/ 2 veces al día, con un máximo de 5 comprimidos al día.



URO CHEM CAT (Insuficiencia renal)

30 ml.

COMPOSICIÓN POR ML

Lespedeza(Exto.seco) 45 mg. Cynara 20 mg. Ortosifón 25 mg. Sorbitol 56 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Gatos: 2 ml cada 6 Kg. de peso/2 veces al día.



Jeringa dosificadora

NEFROCHEM (Insuficiencia renal crónica)

75, 150 y 300 g.

COMPOSICIÓN

Lespedeza capitata, Raíz de Rheum rhabarbarum, Cynara, Ortosiphon, Chitosan (quitosano), Ácido Eicosapentaenoico microencapsulado (EPA), Ácido Docosahexaenoico microencapsulado (DHA), Harina de Krill, Carbonato cálcico, Hidrolizado de soja.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Vía oral, perros y gatos. Pauta de administración:
 1 g de NEFROCHEM cada 5 kg de peso, 2 veces al día mezclado con la comida.



APARATO CARDIOVASCULAR

MYOFORTEX (Insuficiencia cardíaca)

60 c.



COMPOSICIÓN

L-Carnitina, 425 mg. Taurina, 425 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 comprimido por cada 10 Kg. de peso cada 12 horas.



APARATO DIGESTIVO, BUCODENTAL Y PROTECCIÓN GÁSTRICA

PANCREAZIM (Insuficiencia pancreática)

60 c. y 100 g.



COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Celulosa 30mg. Proteasa 30mg.
Alfa-amilasa 15mg. Lactasa 15mg.
Lipasa 15mg.

COMPOSICIÓN POR GRAMO

Celulosa 60mg. Proteasa 60mg.
Alfa-amilasa 30mg. Lactasa 30mg.
Lipasa 30mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

1 comprimido o 1 cucharilla de 1 g. por cada 10 Kg. de peso 2 veces al día (antes de las comidas).



DENTAL CHEM (Halitosis, Antiplaca)

50 g.



COMPOSICIÓN

Harina de algas pardas. Levadura de cerveza. Alcachofa. Pomelo. Clorofila

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Añadir a la comida.
Perros y gatos hasta 10kg: 1/2 cuchara/día.
Perros de 10 a 25kg: 1 cuchara/día.
Perros de más de 25kg.: 2 cucharas/día.



Con cuchara dosificadora

APETICAN (Estimulante del apetito)

60 c.



COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Cynara 35 mg. Boldo 30 mg. Sorbitol 275mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros: 1 comprimido cada 10 Kg. de peso cada 24 horas.



APETICAT (Estimulante del apetito)

30 ml.



COMPOSICIÓN POR ML

Sorbitol 0,09 ml. Boldo 0,012 ml.
Ortosifón 0,012 ml. Aceite de hígado de bacalao 0,010 ml.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Gatos: 1 ml. por cada 10 Kg. de peso, cada 24 horas.



Jeringa dosificadora

DEFENDER (Antidiarreico)

20 y 240 c.



COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Semillas de plantago.
Fosfato dicálcico. Cloruro sódico.
Bicarbonato sódico.
Cloruro potásico.
Hidróxido magnésico.
Pectina. *Enterococcus faecium*.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Cachorros y razas pequeñas (1-10 kg)	Razas medianas (10-25 Kg)	Razas grandes (25-40 Kg)	Razas XL (40-60 Kg)
1 comp./12 h. durante 3 días	2 comp./12 h. durante 3 días	3 comp./12 h. durante 3 días	4 comp./12 h. durante 3 días
4º-5º día: 1/2 comp. /12h.	4º-5º día: 1 comp./12h.	4º-5º día: 2 comp./12h.	4º-5º día: 2-3 comp./12h.



DIGESTOLAC (Protector gástrico)

30 y 60 ml.



COMPOSICIÓN

Manzanilla, Sorbitol, Glicerina.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Se recomienda administrar 30 minutos antes de la comida o de la administración del tratamiento.
Agitar antes de usar.
Abrir el envase, introducir la jeringa en el tapón perforado. Voltar



EXOCRINE OMEGA (IPE)

75 y 150 g.



COMPOSICIÓN

EPA, DHA, Astaxantina, Levadura de cerveza. Celulosa 19,5 mg, Proteasa 19,5 mg, Alfa-amilasa 10 mg, Lactasa 10 mg, Lipasa 10 mg. Vitamina E 8 u.i. *Enterococcus faecium* NICMB 10415(E1707) 1x10⁹ UFC/g

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Vía oral. Administrar espolvoreando sobre el alimento. Perros y gatos hasta 10 kg: 1 g / 2 veces al día. Perros de 10 a 25 Kg: 2 g / 2 veces al día. Perros de + de 25 Kg: 3 g / 2 veces al día. Se recomienda consultar al veterinario antes de su utilización.



COMPLEJOS VITAMÍNICOS

CAL-VIT

60 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Fosfato dicálcico 665 mg. Dextrosa 100 mg. Vitamina A 286 U.I. Vitamina D₃ 58 U.I. Vitamina K₃ 0,5 mcg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 comprimido por cada 10 kg. de peso, una vez al día.



COMPLEJO B

60 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Vitamina B₁ 25 mg. Vitamina B₂ 5 mg. Vitamina B₆ 10 mg. Vitamina B₁₂ 1 mg. Niacina 33 mg. Pantotenato cálcico 16,7mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1 comprimido por cada 10 kg. de peso.



COMPLEJO B PASTA

30 ml.

COMPOSICIÓN POR ML

Vitamina B₁ 16,7mg. Vitamina B₂ 1,67mg. Vitamina B₆ 5,0mg. Vitamina B₁₂ 2mcg. Niacina 33,33 mg. Pantotenato cálcico 16,7mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos: 1ml por cada 10Kg de peso cada 24 horas.



SUPER BIOTIN B

60 c.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO

Vitamina B₁ 100 mcg. Vitamina B₂ 25 mcg. Vitamina B₆ 15 mcg. Vitamina B₁₂ 57 mcg. Biotina 13 mg.

Zinc (quelato de aminoácidos) 6 mg

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros raza pequeña: 1 comp./24 h.
Perros raza mediana: 2 comp./24 h.
Perros raza grande: 4 comp./24 h.



CON ZINC

VIGOR CHEM PRO

60 c. y 100 ml

COMPOSICIÓN

Sorbitol 125 mg. Óxido de magnesio 5 mcg. Vitamina A 5.000 UI. Vitamina D₃ 2.000 UI. Vitamina E 2 UI. Vitamina B₁ 0,88 mg; Vitamina B₂ 1,25 mg. Vitamina B₆ 0,55 mg. Vitamina B₁₂ 0,63 mcg; Vitamina C 10 mg; Vitamina K₃ 2 mg; Niacina 12,5 mg; Pantotenato cálcico 2 mg; Ácido fólico 125 mcg; Biotina 0,5 mcg. L-Lisina 20 mg. DL-Metionina 5 mg. Colina(cloruro) 2,5 mg. L-Leucina 8,3 mg. Glicina 6,75 mg. L-Arginina 4,95 mg. Ácido aspártico 4,65 mg. L-Fenilalanina 4,17 mg. L-Histidina 3,85 mg. Ácido Glutámico 3,75 mg. -Treonina 3,48 mg. L-Alanina 3,17 mg. Isoleucina 2,4 mg. L-Cisteína, 1,7 mg. L-Triptófano 1mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Comprimidos: Animales de hasta 20 Kg: 1 comp/día. Animales de más de 20 Kg: 2 comp/día.

Solución Oral: Perros: 5-10 ml. (1 a 3 cucharadas)/día, según tamaño.

Gatos: 3-5 ml. (1/2 a 1 cucharada)/día, según tamaño.



CON ZINC

VITAMINA C (Antioxidante)

60 c.

VITAMINA C PASTA (Antioxidante)

15 ml.

COMPOSICIÓN

Vitamina C: Comprimido: 700 mg/comprimido; Pasta: 66,6 mg/ml

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Comprimidos: 1 comprimido por cada 10 kg de peso cada 24 horas

Pasta: Administrar 1 ml por cada 10Kg. de peso cada 24 horas



Jeringa dosificadora

VITAMINA K

30 c.

VITAMINA K RAZAS GRANDES

60 c.

VITAMINA K PASTA

15 ml.

COMPOSICIÓN

Vitamina K₃ (3a710)

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

RAZAS GRANDES;

Perros: Administrar 1 comprimido por cada 20 Kg. de peso.

PASTA;

Perros y gatos: 1ml por cada 10 Kg. de peso.

Perros: 1 comprimido por cada 10 Kg. de peso.



Jeringa dosificadora

PIEL Y ANEJOS

PRO-ACID DERM

60 c. y 100 ml.



COMPOSICIÓN

COMPRIMIDO: Ácido eicosapentanoico 40mg, Ácido docosahexanoico 20mg, Ácido gammalinolénico 20mg, Ácido oleico 12mg, Ácido linolénico 0,40mg, Ácido esteárico 3,5mg, Ácido palmítico 10mg, Vitamina A 1.000 UI, Vitamina D₃ 200 UI, Vitamina E 18mg, Pantotenato cálcico 7,5mg, Inositol 3mg, Vitamina B₆ 1mg, Biotina 1mg, Zinc (metionato) 6mg.

SOLUCIÓN: Ácido eicosapentanoico 1350 mg, Ácido docosahexanoico 890 mg, Ácido gammalinolénico 404 mg, Ácido oleico 250 mg, Ácido palmítico 202 mg, Ácido linolénico 92 mg, Ácido esteárico 70 mg, Vitamina A 23.000 UI, Vitamina E 360 UI, Inositol 66 mg, Vitamina B₆ 20 mg, Biotina 0,37 mg, Zinc (metionato) 1.600 mg.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Comprimidos:

Gatos y cachorros: 1 c./ día.
Perros de 5 a 10 Kg. 2 c./día.
Perros de 10 a 20 Kg. 3 c./día.
Perros de más de 20 Kg. 4 c./día.

Solución oral:

Gatos y cachorros: 1 ml. 2 veces/día.
Perros de 5 -10 Kg: 2 ml 2 veces/día.
Perros de 10 - 20 Kg: 3 ml. 2 veces/día.
Perros de más de 20 Kg.: 4 ml. 2 veces/día.



CICADERMIN (Cicatrizante)

100 ml.

COMPOSICIÓN

Aloe vera. Timol. Caléndula. Centella asiática

MODO DE EMPLEO

Vía tópica. Pulverizar sobre la herida o zona afectada 2 ó 3 veces al día.



NATURBACIMICIN (Quemaduras, abrasiones) 15 ml.

COMPOSICIÓN

Aloe Vera. Centella asiática. Aceite de Árbol de Té (Tea Tree Oil).

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel con un suave masaje hasta que se absorba por completo. Se recomienda su uso diario con dos o tres aplicaciones al día.



ALUDERMIN (Cicatrizante, Protector heridas) 270 ml.

COMPOSICIÓN

Aluminio micronizado, 50%.

MODO DE EMPLEO

Vía tópica. Pulverizar sobre la zona afectada.



PROBIÓTICOS Y ESTIMULANTES DE LA INMUNIDAD

BLOCAN (Obstrucción intestinal)

100 ml.

COMPOSICIÓN

Aceite mineral refinado. Dextrosa. *Enterococcus faecium*

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros: 2-60 pulsaciones al día.
Gatos: 2-10 pulsaciones al día.



Ig - YNMUNE 30 - 60 c. y pasta palatable 30 ml.

COMPOSICIÓN

Nucleótidos, Inmunoglobulinas, Omega 3, Coenzima Q10, L- Lisina, Vitamina A, Vitamina D₃, Vitamina E, Vitamina B12, Boldo, Ortosifon, Sorbitol.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Perros y gatos. Dosificación bajo supervisión veterinaria.



ALIMENTOS COMPLETOS DE LACTANCIA

CAN LAIT (Leche con proteína vegetal)

500 g.

COMPOSICIÓN

Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio, Bicarbonato de sodio. Vitaminas.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Una medida llena y enrasada cada 50 ml. De agua a 35-40 °C. Se recomienda usar en biberón durante los primeros 15 días de lactación.



CAT LAIT (Leche con proteína vegetal)

200 g.



Con cacillo y biberón

COMPOSICIÓN

Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio, Bicarbonato de sodio.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Una medida llena y enrasada cada 50 ml. de agua a 35-40 °C. Se recomienda usar en biberón durante los primeros 15 días de lactación.



ALIMENTOS COMPLETOS DE LACTANCIA

GLOBALAIT cachorros Leche + Inmunoglobulina 420 g.

COMPOSICIÓN

Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio heptahidratado, Bicarbonato de sodio. Vitaminas. **Inmunoglobulina.**

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Una medida llena y enrasada cada 50 ml de agua a 35-37°C. Se recomienda usar biberón durante los primeros 15 días de lactación.



GLOBALAIT gatitos Leche + Inmunoglobulina 210 g.

COMPOSICIÓN

Leche desnatada en polvo, Suero de leche, Aceite de soja, Harina de trigo, Sulfato de magnesio heptahidratado, Bicarbonato de sodio. **Inmunoglobulina.**

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Una medida llena y enrasada cada 50 ml de agua a 35 - 37 °C. Se recomienda usar biberón durante los primeros 15 días de lactación.



Con cacillo y biberón

OFTÁLMICOS

OFTAL HA 20 y 125 ml, Nebulizador Spray 25 ml y Gel 15 gr.

COMPOSICIÓN

Hialuronato Sódico 0.15%.
Aloe Vera 10%. Centella Asiática 10%
(asiaticósido y otras saponinas)

DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN

Nebulizador Spray: vía tópica.
Pulverizar a unos 15-20 cm del ojo del animal.
Goteros: vía tópica.
Aplicar 1-2 gotas en uno o ambos ojos.



VISVITAE (Epitelizante ocular) 15 g.

COMPOSICIÓN

Vitamina A (Retinol Palmitato) 10.000 UI
Hialuronato sódico > 0,5%
Agua de Hamamelis 8 mg

DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN

Aplicar sobre el ojo 1 o 2 gotas.
Repetir tantas veces como sea preciso,
siguiendo las instrucciones del veterinario.



ÓTICOS

OTICHEM 125 ml

COMPOSICIÓN

Aceite esencial de romero 0,1 %.
Aceite esencial de tomillo 0,05 %.

DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN

Vía tópica. Se aconseja su empleo en la higiene habitual de los oídos de perros y gatos. Aplicar una pequeña cantidad de producto en el conducto auditivo y masajear suavemente la oreja. En animales con afección de oído consultar al veterinario.



OTICHEM PLUS 125 ml

COMPOSICIÓN

Aceite de semilla de Neem 1 %.
Aceite esencial de tomillo 0,05 %.
Aceite esencial de romero 0,1 %.

DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN

Vía tópica. Se aconseja su empleo en la higiene habitual de los oídos de perros y gatos. Aplicar una pequeña cantidad de producto en el conducto auditivo y masajear suavemente la oreja. En animales con afección de oído consultar al veterinario.



NEUROLÓGICOS Y COMPORTAMIENTOS

COGNIVAN NEUROPROTEC 60 c.

COMPOSICIÓN

Fosfato dicálcico, 440 mg; Almidón de maíz, 30 mg; Ginkgo biloba (hojas), 30 mg; Ginseng (raíz), 15 mg; L-Triptófano, 50 mg
ADITIVOS POR COMPRIMIDO: Vitaminas, pro-vitaminas y sustancias de efecto análogo químicamente bien definidas: Vitamina B2, 40 mg; Niacina (3a314), 37 mg; Vitamina B1 (3a820), 25,5 mg; Pantotenato cálcico, 18 mg; Vitamina B6 (3a831), 11 mg; Vitamina B12, 1,1 mg.

DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN

Vía oral.
Perros hasta 10 Kg: 1 comprimido/día.
Perros hasta 30 Kg: 2 comprimidos/día.
Perros de más de 30 Kg: 3 comprimidos/día.



TRANQUICHEM 60 c.

TRANQUICHEM XL 60 c.

TRANQUI CHEM CAT 30 ml.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

1 comp. /10 Kg. peso cada 12 h.
las primeras 2 semanas.
1 comp./10 Kg. peso cada 24 h.
después.

Perros de más de 20 Kg:
1 comp./20 kg. peso cada 12 h.
los primeros 15 días, 1 comp./20 kg.
peso cada 24 h. después.

Gatos: 1 ml/día

COMPOSICIÓN

Óxido de magnesio. Subproductos de plantas. L-Triptófano



DERMATOLÓGICOS Y COSMÉTICOS

CHAMPÚ ACTIVO INSECTICIDA 250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN

Permetrina 0,1 %.

USOS

Uso exclusivo en perros. Permite la eliminación de parásitos en general.



DERMO CHAMPÚ

250 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN

Aceite de árbol de té. Avena sativa

USOS

Para perros y gatos con problemas dermatológicos como micosis, dermatitis, eccemas, alergias, Malassezia spp., sequedad de piel...



ESPUMA LAVADO EN SECO

Spray 200 ml.

COMPOSICIÓN

Pantenol, 0,05%. Lanolina, 0,55%.

USOS

Espuma para limpieza en seco, no afecta el pH natural de la piel del animal. Especialmente recomendado en cachorros.



MYCOFLET (Antimicótico)

250 y 500 ml.

COMPOSICIÓN

Nanomoléculas de cobre coloidal, tea tree oil, propóleo, sustancias espesantes y estabilizantes.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar en la piel dañada, renovando 2-3 veces al día hasta la completa reparación de la zona tratada. Sarna: se recomienda Mycoflet junto a un acaricida bajo la supervisión del veterinario.



NEOTOPIC (Antiinflamatorio)

100 g.

COMPOSICIÓN

Caléndula. Eucalipto. Mentol. Ácido salicílico. Alcanfor.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar sobre la superficie cutánea masajeando lentamente hasta su total absorción, dos o tres veces al día.



CAVIMAX ESPUMA

200 ml

COMPOSICIÓN

Extracto de Caléndula officinalis. Menta.

MODO DE UTILIZACIÓN

Extender la espuma en las zonas afectadas, evitando las mucosas y los ojos. Aplicar 1 o 2 veces al día.



CIRUGÍA

CICASTICK (Adhesivo tisular)

2 g.

COMPOSICIÓN

Etil-2 Cianocrilato. Polimetilmetacrilato.

MODO DE UTILIZACIÓN

Indicado para el cierre de incisiones quirúrgicas de hasta 9 cm, como alternativa a las suturas o las grapas.



YODERMIN ANTISÉPTICO (Desinfectante) 450 ml y 1 L.

COMPOSICIÓN

Povidona yodada 3%, Agentes suavizantes, Agentes hidratantes.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar la solución directamente sobre la piel con la ayuda de una compresa estéril si es preciso. Dejar secar durante 30 minutos.



APEX, REPELENTES Y DESINFECTANTES

DIDISAN RTU (Desinfectante)

500 ml.

¡Listo para usar!

COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 0,15 % + Cloruro de Dimetil Amonio 0,10 %.

MODO DE UTILIZACIÓN

1 litro para una superficie total de 5-10 m². Pulverizar la superficie a tratar. Dejar actuar 15 minutos. Fórmula con efecto sinérgico que permite al aplicarlo, limpiar y desinfectar.



DIDISAN DT

100 ml

COMPOSICIÓN

Cloruro de Didecildimetilamonio 2,4 %

MODO DE UTILIZACIÓN

Colocar el envase sobre una superficie lisa y oprimir la válvula de descarga total. Dejar que se vacíe el contenido del aerosol por completo sin presencia de personas. En 2-3 minutos cubre un volumen de 60 m³. Se recomienda dejar actuar durante una hora y ventilar 15 minutos tras el tratamiento.



NEEMTOP COLLAR

60 y 30 cm

COMPOSICIÓN

Collar: Aceite de Neem, Eucalipto, Menta, Citronela.
Pipeta: Esencia de Melisa, Esencia de Geranio Rosa, Esencia de Clavo, Citronela, Aceite de Neem.

MODO DE UTILIZACIÓN

Collar: Colocar el collar alrededor del cuello del animal, dejando un espacio de 2 dedos y cortando la cantidad sobrante.

NEEMTOP SPOT ON

5 pipetas de 5 ml



Pipetas: Razas L o XL: 1 pipeta. Razas S, M y Gatos: 1/2 pipeta. Renovar la aplicación a los 21-28 días.

ANTIFLY FORTE (Repelente)

500 ml, 1 y 5 L.

COMPOSICIÓN

Aceite Citronella, Aceite de Melissa, Aceite de Geranio Rosa, Aceite de Clavo, Tea Tree Oil.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar sobre el animal, 2 o 3 veces al día, evitando el contacto con mucosas, ojos y heridas. Se recomienda su uso en instalaciones donde habiten los animales.



FIPREX

Pipetas

Con la mayor cantidad de Fipronilo por pipeta del mercado



COMPOSICIÓN: Fipronilo

MODO DE EMPLEO: Abrir la pipeta, separar el pelo hacia los hombros y aplicar todo el contenido sobre la piel, desde la columna vertebral hasta la base de la cola.

FIPREX DUO

Spot-on



COMPOSICIÓN

Fipronilo, (S)-metopreno.

MODO DE UTILIZACIÓN

Solución Spot-on. Separar el pelo del animal por la base del cuello "la cruz del animal", entre las escápulas, y aplicar toda la pipeta. Se recomienda usar en días secos y esperar 48 horas para poder bañarlo.

FARMACOLÓGICOS

CLORTETRA SPRAY

335 ml.

COMPOSICIÓN

Clortetraciclina clorhidrato, Azul patente V (E131), Excipientes y propelente c.s.p.

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Agitar el Spray antes de usar. Limpiar la zona a tratar y eliminar los tejidos necrosados. Pulverizar la zona con el brazo extendido hasta cubrirla. Repetir el tratamiento según evolución.



KABERSTOP

7 y 15 ml.

COMPOSICIÓN

Cabergolina 50 ug/ml

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos 0,1ml/kg 1 toma/día durante 4-6 días dependiendo de la gravedad del caso clínico.



VITABIOL B

20 ml.

COMPOSICIÓN

Vitamina B1 12,5 mg, Vitamina B2 1,25 mg, Vitamina B6 2 mg, Vitamina B12 1,25 mg, Nicotinamida 15 mg, Pantotenato de calcio 12,5 mg.

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Injectable intramuscular.
Perros y gatos: 0,4 ml/5 kg peso y día.



Chemical Ibérica
Productos veterinarios

Ctra. Burgos-Portugal, km. 256
37448 Calzada de Don Diego, Salamanca. SPAIN
Tel.: + 34 923 34 20 93 • Fax: + 34 923 34 20 85
www.chemicaliberica.com