

FRONTLINE GATOS PIPETAS

FRONTLINE® SPOT-ON GATO Antiparasitario externo en solución tópica

Laboratorio MERIAL LABORATORIOS, S.A .

Forma farmacéutica: Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

Composición: por ml: Fipronil 100 mg.

Propiedades farmacológicas: Fipronil, perteneciente a la familia de los fenilpirazoles, actúa como inhibidor no competitivo del GABA del sistema nervioso de los parásitos.

Tras la aplicación local del fipronil sobre la piel del gato, el paso transcutáneo del fipronil es prácticamente nulo.

Indicaciones y especies de destino: Gatos: Parasitosis externas.

- Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) del gato.
- Frontline® Spot on gato elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP).
- Tratamiento y control de las infecciones por piojo picador (*Felicola subrostratus*).


Contraindicaciones: En ausencia de datos disponibles, el producto no debe utilizarse en gatitos de menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg. No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre, ...) o convalecientes. No utilizar en conejos.

Efectos secundarios:

- En caso de lamido puede observarse un breve periodo de supersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- De forma esporádica, se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: Reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (escamas, alopecia local, prurito, eritema), así como prurito general o alopecia.
- Excepcionalmente, tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), vómitos.
- Administrar la dosis recomendada.

Vía de administración: Uso externo, de aplicación tópica sobre la piel.

- Romper el extremo de la pipeta a nivel de la parte prerecortada. Vaciar completamente la pipeta, directamente sobre la piel, separando el pelo del animal, en 2 puntos: en la base del cuello y entre las dos escápulas, para evitar el lamido.



Posología:

Gatos: 1 pipeta (0,50 ml)/gato como parte de la estrategia en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP), se recomienda una aplicación mensual de los gatos alérgicos.

- La dosis única garantiza una duración de la protección contra las nuevas infestaciones por pulgas de hasta 5 semanas frente a piojos.
- En caso necesario, volver a tratar el animal a las 4 semanas de realizada la primera aplicación.

Precauciones especiales:

- Es importante asegurarse de que el producto se aplica en el área en que el animal no puede lamerse y de que los animales no se lamen unos a otros después del tratamiento.
- No se dispone de datos sobre el efecto de la inmersión en agua (baños con jabón) sobre la eficacia del producto en gatos. No obstante, en base a la información disponible en perros bañados en champú a partir de 2 días después de la aplicación del producto, no se recomienda bañar a los animales a partir de los 2 días después de la aplicación del producto. Evitar el contacto con los ojos del animal.
- Este producto puede causar irritación ocular y de la mucosa. Por tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca o con los ojos.
- Evitar el contacto con los dedos. Si esto ocurre, lávense las manos con agua y jabón.
- Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura.
- Lavarse las manos después de su uso.
- Los animales tratados no deberían ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Frontline® Spot On Gato puede ser utilizado durante la reproducción, en hembras gestantes y en lactación.

Modo de conservación: Preservar del calor y de la humedad.

Presentación :

Envase con 3 pipetas de 0,50 ml.

Envase con 6 pipetas de 0,50 ml.

Reg. Nº: 1.163-ESP