

FRONTLINE PERROS PIPETAS

FRONTLINE® SPOT-ON PERRO Antiparasitario externo en solución tópica Laboratorio MERIAL LABORATORIOS, S.A .

Blíster de 3 pipetas o envase con 6 pipetas.

Pipetas de 0,67 ml para perros de 2 a 10 kg.
Pipetas de 1,34 ml en perros de 10 a 20 kg.
Pipetas de 2,68 ml en perros de 20 a 40 kg.
Pipetas XL en perros de 40 a 60 kg en blíster de 3 pipetas.

Forma farmacéutica: Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

Composición:

Fipronil 10 g; butilhidroxianisol 0,02 g; butilhidroxitolueno 0,01 g; excipiente c.s.p. 100 ml.

Propiedades farmacológicas: Fipronil, perteneciente a la familia de los fenilpirazoles, actúa como inhibidor no competitivo del GABA del sistema nervioso de los parásitos.

Indicaciones y especies de destino: Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes ricinus*).

- Frontline® Spot On Perros elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP).
- Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador (*Trichodectes canis*).

Contraindicaciones:

- En ausencia de datos disponibles, no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o peso inferior a 2 kg.
- No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes.
- No utilizar en conejos.
- No utilizar en gatos ya que podría llevar a sobredosisificación.

Efectos secundarios:

- En caso de lamido, puede observarse un breve periodo de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del componente.
- De forma esporádica, se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: Reacciones cutáneas transitorias en el punto de la aplicación (decoloración de la piel, alopecia local, prurito, eritema) así como prurito general o alopecia.
- Excepcionalmente tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos) vómitos o síntomas respiratorios.
- Administrar la dosis recomendada.

Vía de administración: Uso externo, aplicación tópica sobre la piel.

- Romper el extremo de la pipeta por la parte precortada. Aplicar el producto entre los hombros del animal, separando el pelo hasta que la piel quede al descubierto. Colocar la punta de la pipeta sobre la piel y apretar varias veces hasta vaciar completamente su contenido.

Posología: 1 pipeta de 0,67 ml en perros de 2 a 10 kg.

1 pipeta de 1,34 ml en perros de 10 a 20 kg.

1 pipeta de 2,68 ml en perros de 20 a 40 kg.

1 pipeta XL para perros de 40 a 60 kg.

- Cada pipeta, aplicada de forma adecuada y según la posología indicada, confiere una protección de 2 meses frente a las infestaciones de pulgas y 1 mes frente a las infestaciones de garrapatas. El tratamiento frente a garrapatas se hará como mínimo una vez al mes. Frente a piojos, es caso necesario, volver a tratar al animal a las 4 semanas de realizada la primera aplicación.
- No se recomienda bañar al perro durante las 48 horas anteriores y posteriores a la aplicación del producto. Como en todos los tratamientos antiparasitarios tópicos, se evitará el contacto con la zona tratada hasta que no se haya secado.

Precauciones especiales:

- Es importante asegurarse que el producto se aplica en un área en que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se lamen los unos a los otros después del tratamiento.
- Deben evitarse los baños/inmersión en agua durante los 2 días siguientes a la aplicación del producto así como baños más frecuentes que una vez por semana. Evitar el contacto con los ojos del animal.
- Este producto puede causar irritación ocular y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca y con los ojos.
- Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lávense las manos con agua y jabón.
- Después de la exposición ocular accidental, aclarar el ojo suavemente con agua pura.
- Lávense las manos después de su uso.
- Los animales tratados no deben ser tocados hasta que el punto de aplicación del producto esté seco. No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Frontline® Spot On puede ser utilizado durante la reproducción en perras gestantes y en lactación.

Modo de conservación: Preservar del calor y de la humedad.

Presentación : Blíster de 3 pipetas o envase con 6 pipetas.

Pipetas de 0,67 ml para perros de 2 a 10 kg.

Pipetas de 1,34 ml en perros de 10 a 20 kg.

Pipetas de 2,68 ml en perros de 20 a 40 kg.

Pipetas XL en perros de 40 a 60 kg en blíster de 3 pipetas.

Reg. Nº: 1.230-ESP