

# METACAM<sup>®</sup> 1,5 mg/ml

Antiinflamatorio no esteroide-analgésico-antipirético  
en suspensión oral

## Laboratorio

---

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

## Forma farmacéutica

---

Suspensión oral (Susp.o.)

## Composición por ml:

---

Meloxicam 1,50 mg.

## Propiedades farmacológicas

---

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) del grupo de las oxicamas, que actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Los estudios *in vitro* e *in vivo* demostraron que inhibe a la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en mayor medida que a la ciclooxigenasa-1 (COX-1).

*Características farmacodinámicas:* Ejerce efectos antiinflamatorios, analgésicos, antiexudativos y antipiréticos. Reduce la infiltración de leucocitos hacia el tejido inflamado.

*Características farmacocinéticas:* Se absorbe completamente después de la administración oral, obteniéndose concentraciones plasmáticas máximas tras aproximadamente 4,5 horas. Alrededor del 97% del meloxicam se une a proteínas plasmáticas. Tiene una semivida de eliminación de 24 horas. Aproximadamente el 75% de la dosis administrada se elimina por las heces y el resto por la orina. Se ha demostrado que todos los metabolitos principales son farmacológicamente inactivos.

## Interacciones e incompatibilidades

---

- Otros AINEs, diuréticos, anticoagulantes, antibióticos aminoglucósidos y sustancias con alta afinidad a proteínas pueden competir por la unión y producir efectos tóxicos. Metacam<sup>®</sup> no se debe administrar junto con otros AINEs o glucocorticosteroides.
- El pretratamiento con sustancias antiinflamatorias puede producir reacciones adversas adicionales o aumentadas, por ello, antes de iniciar el tratamiento debe establecerse un período libre de tratamiento con tales medicamentos veterinarios de al menos 24 horas. En cualquier caso, el período libre de tratamiento debe tener en cuenta las propiedades farmacológicas de los medicamentos utilizados previamente.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Perros:** Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.

## Contraindicaciones

---

- Animales en gestación o lactancia.
- Trastornos gastrointestinales como irritación y hemorragia.
- Disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos.
- Hipersensibilidad al principio activo o a algún excipiente.
- No usar en perros de menos de 6 semanas.

## Efectos secundarios

---

Ocasionalmente se han registrado reacciones adversas típicas de los AINEs, tales como pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces, apatía e insuficiencia renal. Estos efectos secundarios tienen lugar generalmente durante la primera semana de tratamiento y, en la mayoría de casos, son transitorios y desaparecen después de la finalización del tratamiento, pero en muy raros casos pueden ser graves o mortales.

## Vía de administración

---

Oral.

## Posología

---

**Perros:** *Inicial:* 0,20 mg de meloxicam/kg p.v., en dosis única. *Mantenimiento:* 0,10 mg de meloxicam/kg p.v. una vez al día. Para tratamientos de larga duración, una vez observada la respuesta clínica (después de más de 4 días), la dosis puede ser ajustada a la mínima dosis individual efectiva.

- Agitar bien antes de su uso.
- Administrar ya sea mezclado con el alimento o directamente en la boca.
- Administrar utilizando el gotero dispensador del frasco (para razas muy pequeñas) o bien la jeringa dosificadora incluida en el envase.
- Debe prestarse especial atención a la exactitud de la dosis.

## Precauciones especiales

---

- En caso de que se produzcan reacciones adversas, se deberá suspender el tratamiento y consultar con un veterinario.
- Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que existe un riesgo potencial de toxicidad renal.
- Este medicamento para perros no deberá ser usado en gatos ya que no es apropiado para su uso en esta especie. Para gatos, se deberá usar Metacam® 0,5 mg/ml suspensión oral para gatos.
- Personas con hipersensibilidad conocida a los AINEs deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.
- En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrela el prospecto o la etiqueta.

## Modo de conservación

---

- No requiere condiciones especiales de conservación.
- Período de validez después de abierto el frasco: 6 meses.

## Observaciones

---

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Frasco con 10 ml.  
Frasco con 32 ml.  
Frasco con 100 ml.

## Reg. Nº

---

EU/2/97/004/003 (10 ml)  
EU/2/97/004/004 (32 ml)  
EU/2/97/004/005 (100 ml)

## Imagen

---

