

ADVOCATE *Spot-on* PARA GATOS Y HURONES

**Antiparasitario externo
en solución *spot-on***

Laboratorio

BAYER HISPANIA, S.L.

Forma farmacéutica

Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

Composición por pipeta:

Imidacloprid 10% y moxidectina 1%. Butilhidroxitolueno.

Propiedades farmacológicas

Imidacloprid es un ectoparasiticida del grupo cloronicotinílico eficaz frente a las fases larvarias de la pulga y las pulgas adultas que presenta una actividad farmacológica mínima en mamíferos. Se distribuye rápidamente sobre la piel del animal en el primer día de aplicación.

Moxidectina es un parasiticida de la familia de la milbemicina (lactona macrocíclica) activo frente a gran número de parásitos internos y externos, frente a las fases larvarias (L3, L4) de *Dirofilaria immitis* y frente a nematodos gastrointestinales. Se absorbe a través de la piel y se distribuye por vía sistémica alcanzando unas concentraciones plasmáticas máximas aproximadamente de 1 a 2 días en gatos. Se elimina lentamente del plasma.

Interacciones e incompatibilidades

Durante el tratamiento con Advocate no debe administrarse ningún otro antiparasitario del tipo lactona macrocíclica.

Indicaciones y especies de destino

Gatos: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Tratamiento de infestación por ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*). Prevención de la filariosis (larvas L3/L4 de *Dirofilaria immitis*). Tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales (larvas L4, adultos inmaduros y adultos de *Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*). Tratamiento estratégico de la DAPP.

Hurones: Tratamiento y prevención de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y la prevención de la filariosis (larvas L3/L4 de *Dirofilaria immitis*).

Contraindicaciones

- No utilizar en gatitos de menos de 9 semanas.
- No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o alguno de los excipientes.
- Para hurones: No usar Advocate para gatos grandes (0,8 ml) ni Advocate para perros (todos los tamaños).

Efectos secundarios

Advocate puede ocasionar un prurito pasajero en el gato. En raras ocasiones, puede producirse grasa en el pelo, eritema y vómitos. Estos síntomas remiten sin tratamiento.

En raras ocasiones, se pueden dar reacciones locales de hipersensibilidad. Si el animal lame la zona de aplicación después del tratamiento, rara vez pueden observarse signos neurológicos pasajeros. El medicamento tiene sabor amargo y si se lame puede producirse salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece al cabo de unos minutos sin tratamiento.

Muy raras veces, el medicamento puede dar lugar en el punto de aplicación a una sensación que origine alteraciones pasajeras del comportamiento como letargia, agitación o inapetencia.

Vía de administración

Tópica.

Posología

Gatos: Dosis mínima recomendada es de 0,1 ml de Advocate para gatos/kg.

Hurones: Debe administrarse una pipeta de Advocate para gatos pequeños y hurones (0,4 ml) por animal.

- Tratamiento y prevención de infestación por pulgas: Una vez al mes en gatos y en hurones cada tres semanas.
- Prevención de infestación por filarias: Una vez al mes en gatos y hurones.
- Tratamiento de infestación por ácaros del oído: Una sola dosis en gatos.
- Tratamiento de las infecciones por nemátodos gastrointestinales: una vez al mes en gatos.

Precauciones especiales

Para los animales:

- El tratamiento de gatos que pesen menos de 1 kg y hurones que pesen menos de 0,8 kg así como animales enfermos o débiles debe basarse en la evaluación del beneficio/riesgo del veterinario. Asimismo, para el uso en la gestación y lactancia.
- Debe evitarse que el contenido de la pipeta o la dosis aplicada entre en contacto con los ojos o la boca del animal receptor y/u otros animales. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.
- Se recomienda que los gatos y hurones que vivan o viajen a zonas endémicas de *Dirofilaria immitis*, se traten una vez al mes como tratamiento profiláctico. En caso de diagnóstico de adultos de *D. immitis* el tratamiento será de acuerdo con el conocimiento científico actual.

Para la persona que administra el medicamento:

- Evítese el contacto con la piel, los ojos y la boca.
- No coma, beba ni fume durante la aplicación.
- Lávese bien las manos después de usar el medicamento.
- Tras la aplicación del medicamento no acaricie ni asee a los animales hasta que el lugar de aplicación esté seco.
- En caso de salpicadura accidental sobre la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si es sobre los ojos, éstos deberán enjuagarse bien con agua.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a algún componente deben aplicar el medicamento con precaución.
- En muy raros casos, el medicamento puede producir sensibilización cutánea o reacciones cutáneas pasajeras (p. ej. alergia, irritación u hormigueo). Si los síntomas cutáneos u oculares persisten o en caso de ingestión accidental del medicamento, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto.

Modo de conservación

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 3 pipetas:

Advocate *Spot-on* para Gatos pequeños (≤ 4 kg) y hurones: pipetas con 0,4 ml.

Advocate *Spot-on* para Gatos grandes ($>4-8$ kg): pipetas con 0,8 ml.

Reg. Nº

EU/2/03/039/001

EU/2/03/039/003

Imagen

