

TABERDOG[®] Collar Permetrina

Insecticida en collar

Laboratorio

DIVASA-FARMAVIC, S.A. (DFV[®])

Forma farmacéutica

Collar (Collar)

Composición por g de collar:

Permetrina (25 cis/75 trans) 100 mg.

Propiedades farmacológicas

La permetrina es un ectoparasiticida de uso tópico.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar otros insecticidas simultáneamente con el collar.

Indicaciones y especies de destino

Perros (Adultos y Cachorros de cualquier edad): Parasitosis externas producidas por:

- Pulgas: *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y *Pulex irritans*.
- Garrapatas: *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp. y *Otobius megnini*.
- Piojos: *Linognathus* spp.
- Repelente de moscas y mosquitos.

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa y/o a algún excipiente.

Efectos secundarios

No se han descrito en perros.

Vía de administración

Uso cutáneo.

- Colocar el collar alrededor del cuello del animal de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar y el cuello.
- Cortar cualquier exceso de longitud del collar.

Posología

Perros: Un collar por animal.

- Para asegurar una continuada acción antiparasitaria el collar debe llevarse permanentemente.
- Una vez sacado del envase original, el collar es activo durante 4 meses.

Precauciones especiales

- Solo para uso externo.
- No abrir la bolsa protectora que contiene el collar hasta el momento de su uso.
- Evitar que el animal muerda el collar.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

- Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
- Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Observaciones

De uso veterinario.

- Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Cajas conteniendo 1 bolsa con 1 collar de 40, 60 y 75 cm.

Reg. N°

208 ESP