

EFFINOL 2,5 mg/ml Solución para Pulverización Cutánea para Perros y Gatos

Insecticida y acaricida

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución para pulverización (Pulv.)

Composición por ml:

Fipronilo 2,5 mg.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Tratamiento de infestaciones por piojos (*Trichodectes canis*).

Gatos: Tratamiento y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*). Tratamiento de infestaciones por piojos (*Felicola subrostratus*).

El medicamento veterinario se puede usar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas (DAPP).

Contraindicaciones

- No administrar a animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.
- No administrar a conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento veterinario e incluso la muerte.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o al alcohol.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame, puede observarse un periodo breve de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- Entre las reacciones adversas sospechosas extremadamente raras, se describieron reacciones cutáneas transitorias como eritema, prurito o alopecia después del uso.
- En casos excepcionales, se observaron hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos), vómitos o signos respiratorios después del uso.

Vía de administración

Uso cutáneo.

Posología

Perros y Gatos: Para humedecer el pelaje hasta la piel, aplicar de 3 a 6 ml/kg de peso corporal según la longitud del pelo: 3 ml/kg peso corporal para animales de pelo corto hasta 6 ml/kg peso corporal para animales de pelo largo.

- Como parte de la estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia se recomienda una aplicación mensual a los animales alérgicos y a todos los animales que viven junto a él.

Precauciones especiales

- Evitar el contacto con los ojos de los animales.
- No exceder la dosis recomendada.
- No pulverizar directamente en áreas dañadas de la piel.
- Permitir que los animales tratados se sequen en una habitación bien ventilada.
- No se recomienda bañar o enjabonar a los animales durante los 2 días previos o posteriores al tratamiento con el medicamento veterinario.

Modo de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Presentación

Envases de 100, 250 y 500 ml.

Reg. Nº

3103 ESP