

EFFINOL 50 mg Solución *Spot-on* para Gatos

Solución *spot-on* para gatos

Laboratorio

CALIER

Forma farmacéutica

Solución para unción dorsal puntual (Sol.u.d.p.)

Composición por ml:

Sustancia activa: Fipronilo 100 mg. *Excipientes:* Butilhidroxianisol (E-320) 0,2 mg; butilhidroxitolueno (E-321) 0,1 mg; alcohol bencílico 285 mg.

Propiedades farmacológicas

Grupo farmacoterapéutico: Ectoparasiticidas para uso tópico, incluyendo insecticidas.
Código ATCvet: QP53AX15.

El fipronilo es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. Actúa inhibiendo el complejo GABA, uniéndose al canal de cloro y bloqueando la transferencia pre- y postsináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares. Esto genera una actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos o ácaros.

Indicaciones y especies de destino

Gatos: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*) en gatos.

El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP) siempre que haya sido diagnosticada previamente por un veterinario.

El medicamento veterinario tiene una eficacia de 5 semanas frente a pulgas. La duración de la eficacia acaricida contra garrapatas es de hasta 2 días.

Contraindicaciones

- En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en gatitos menores de 7 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg. No usar en animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.
- No usar en conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento veterinario e incluso la muerte.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
- Los estudios de laboratorio efectuados con fipronilo no han demostrado efectos teratogénicos o embriotóxicos.
- No se han efectuado estudios con este medicamento en gatas gestantes y lactación. El uso durante la gestación y lactación únicamente debe efectuarse previa consulta con el veterinario responsable y de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el mismo.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame, puede observarse un periodo breve de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- Entre las reacciones adversas sospechosas extremadamente raras, se han descrito reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación (escamosis, alopecia local, prurito, eritema) y prurito o alopecia general.
- En casos excepcionales, se observaron hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos), o vómitos después del uso.

Vía de administración

Tópica en la piel.

Posología

Gatos: 1 pipeta de 0,5 ml por gato.

Precauciones especiales

- Solo para uso externo.
- Los animales deben pesarse con precisión antes del tratamiento.
- No se ha documentado la toxicidad potencial del medicamento veterinario para gatitos de menos de 7 meses que están en contacto con la madre tratada. Por lo que se debe tener precaución especial en estos casos.
- No aplicar el medicamento veterinario en heridas o en piel dañada.
- No usar en especies no identificadas como especies de destino, especialmente en conejos y cobayas.
- Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario es aplicado en un área en la que el animal no se pueda lamer, y asegurarse que los animales no se puedan lamer unos a otros después del tratamiento.
- El medicamento veterinario no evita que las garrapatas se enganchen a los animales. Por lo que la transmisión de enfermedades infecciosas mediante garrapatas no puede ser completamente excluida si las condiciones no son favorables.
- Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos inmediatamente con agua.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Observaciones

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Presentación

Blíster de 1 pipeta de 0,5 ml. Caja de 1, 2, 3, 6 y 10 blísteres de 3 pipetas de 0,50 ml.
Caja con 30 blísteres de 1 pipeta de 0,50 ml.

Reg. Nº

3045 ESP