

# **DUOFLECT<sup>®</sup> para Perros 2-10 kg y Gatos >5 kg**

**Antiparasitario externo en solución *spot-on***

## **Laboratorio**

---

CEVA SALUD ANIMAL

## **Forma farmacéutica**

---

Pipeta (Pipeta)

## **Composición por pipeta:**

---

Fipronilo 121 mg; (S)-metopreno 60 mg.

## **Propiedades farmacológicas**

---

Fipronilo es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles y que actúa por contacto.

(S)-metopreno es un IGR que inhibe el desarrollo de las fases inmaduras de los insectos. Actúa por contacto.

## **Interacciones e incompatibilidades**

---

Ninguna conocida.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Perros:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*).

- La eficacia insecticida frente a pulgas adultas persiste durante 9 semanas. Previene la multiplicación de pulgas por inhibición de la eclosión de los huevos de pulga y del desarrollo de huevos en pulgas adultas durante 8 semanas.
- La eficacia acaricida inmediata frente a garrapatas persiste durante 6 semanas.

**Gatos:** Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Rhipicephalus turanicus*).

- La eficacia insecticida frente a pulgas adultas persiste durante 8 semanas. Previene la multiplicación de pulgas por inhibición de la eclosión de los huevos de pulga y del desarrollo de huevos en pulgas adultas durante 6 semanas.
- La eficacia acaricida inmediata frente a garrapatas persiste durante 5 semanas.
- Puede utilizarse como parte del tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).

## Contraindicaciones

---

- En ausencia de datos disponibles, no debe utilizarse en cachorros ni gatitos de menos de 8 semanas de edad, en perros que pesen menos de 2 kg ni en gatos que pesen menos de 1 kg.
- No utilizar en conejos.
- No usar en animales con hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

## Efectos secundarios

---

- Si el animal se lame la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria debido principalmente a los excipientes del medicamento. Tras la ingestión del medicamento algunos perros también pueden vomitar.
- Pueden producirse efectos cosméticos transitorios como pelos de punta, aspecto húmedo, residuo seco o ligera descamación, en la zona de aplicación. Estos cambios no afectan a la seguridad o eficacia del producto.

## Vía de administración

---

Tópica.

## Posología

---

**Perros y Gatos:** 1 pipeta/animal.

- Puede repetirse cada 6 semanas en perros, cada 5 semanas en gatos o según se considere apropiado.
- No repetir a intervalos inferiores de 2 semanas.

## **Precauciones especiales**

---

- Únicamente para uso externo. No administrar por vía oral.
- Es importante asegurarse de que se aplica en una zona que el animal no puede lamer. No permita que animales recientemente tratados se laman unos a otros.
- Evite el contacto con los ojos del animal. En caso de que entre en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua.
- No aplicar en heridas o lesiones en la piel.

## **Modo de conservación**

---

No requiere condiciones especiales de conservación.

## **Observaciones**

---

Sin prescripción veterinaria.

## **Presentación**

---

Caja con 3 pipetas.

## **Reg. N°**

---

2997 ESP