

EFFIPRO 67 mg/134 mg/268 mg/402 mg Solución *Spot-on* para Perros Pequeños/Medianos/Grandes/Muy Grandes

Antiparasitario externo en solución tópica

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA

Forma farmacéutica

Pipeta (Pipeta)

Composición por pipeta:

Para Perros Pequeños: Fipronilo 67 mg/0,67 ml.

Para Perros Medianos: Fipronilo 134 mg/1,34 ml.

Para Perros Grandes: Fipronilo 268 mg/2,68 ml.

Para Perros Muy Grandes: Fipronilo 402 mg/4,02 ml.

Propiedades farmacológicas

Fipronilo es un acaricida e insecticida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. Actúa inhibiendo el complejo GABA, uniéndose al canal de cloro y bloqueando la transferencia pre y postsináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares. Esto genera una actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos o acáridos.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Dermacentor reticulatus*).

- La eficacia insecticida contra nuevas infestaciones por pulgas adultas dura hasta 8 semanas.
- El producto tiene eficacia acaricida persistente hasta 4 semanas contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Si el animal ya tiene garrapatas de algunas especies (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*) cuando se aplica el producto, puede que todas las garrapatas no mueran en las primeras 48 horas pero morirán en 1 semana.
- Este producto puede utilizarse en el marco de una estrategia de tratamiento contra dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP), cuando ésta se haya diagnosticado previamente por el veterinario responsable.

Contraindicaciones

- No usar en cachorros menores de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg, a falta de datos disponibles.
- No usar en animales enfermos o convalecientes.
- No administrar a conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento e incluso la muerte.
- No administrar a gatos (podría provocarse una sobredosificación).
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de sus excipientes.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame, podrá observarse un periodo breve de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- En casos extremadamente raros, se han descrito reacciones cutáneas transitorias en el lugar de aplicación (decoloración de la piel, alopecia local, prurito, eritema) y prurito o alopecia general. En casos excepcionales, se observaron hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos), vómitos o signos respiratorios después del uso.

Vía de administración

Solo para uso externo. Aplicación tópica en la piel.

Posología

Perros: Administrar por aplicación tópica en la piel según el peso corporal del animal:

- 1 pipeta de 0,67 ml para perros con peso superior a 2 kg y hasta 10 kg peso corporal.
- 1 pipeta de 1,34 ml para perros con pesos entre 10-20 kg.
- 1 pipeta de 2,68 ml para perros con pesos entre 20-40 kg.
- 1 pipeta de 4,02 ml para perros con pesos entre 40-60 kg.
- Para perros con peso superior a 60 kg aplicar dos pipetas de 2,68 ml.
- Separar el pelaje del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la pipeta directamente contra la piel exterior y apretar varias veces para vaciar su contenido. Repetir el procedimiento en uno o dos puntos distintos a lo largo del lomo del animal.
- Aplicar en zonas donde el animal no pueda lamer el producto y asegurarse de que los animales no puedan lamerse unos a otros después del tratamiento.

Precauciones especiales

- El intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas.
- Lavar con champú una hora antes del tratamiento no afecta a la eficacia del producto contra las pulgas.
- Se debe evitar el baño o la inmersión en agua en los dos días siguientes a la aplicación del producto. La inmersión semanal en agua durante un minuto reduce el periodo de persistencia de la eficacia insecticida contra pulgas durante una semana.
- Para un control óptimo tratar a todos los animales domésticos con un insecticida adecuado.
- No manipular a los animales tratados hasta que el lugar de aplicación esté seco.
- Evitar que el producto entre en contacto con los ojos del animal.
- Lavarse las manos después de su uso.

Modo de conservación

Consérvese a menos de 30 °C y en lugar seco. Guardar en envase original.

Presentación

Envase con 4, 24 y 60 pipetas, está última presentación solo para Effipro 67 mg, 134 mg y 268 mg.

Reg. Nº

EFFIPRO 67 mg sol. *spot-on* Perros Pequeños: 2021 ESP
EFFIPRO 134 mg sol. *spot-on* Perros Medianos: 2022 ESP
EFFIPRO 268 mg sol. *spot-on* Perros Grandes: 2023 ESP
EFFIPRO 402 mg sol. *spot-on* Perros Muy Grandes: 2024 ESP

Imagen

