

EFFIPRO 50 mg Solución *Spot-on* para Gatos

Antiparasitario externo en solución tópica

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA

Forma farmacéutica

Pipeta (Pipeta)

Composición por pipeta:

Fipronilo 50 mg por pipeta de 0,5 ml.

Propiedades farmacológicas

Fipronilo es un acaricida e insecticida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles. Actúa inhibiendo el complejo GABA, uniéndose al canal de cloro y bloqueando la transferencia pre y postsináptica de los iones cloruro a través de las membranas celulares. Esto genera una actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de los insectos o acáridos.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Gatos: Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Dermacentor reticulatus*).

- El producto tiene eficacia acaricida persistente hasta 2 semanas contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*).
- Si el animal ya tiene algunas especies de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus*) al aplicar el producto, puede ocurrir que todas las garrapatas no mueran en las 48 horas, pero morirán dentro de la semana.

Contraindicaciones

- No utilizar en gatitos menores de 2 meses de edad y que pesen menos de 1 kg.
- No administrar a animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.
- No administrar a conejos, pues pueden producirse reacciones adversas al medicamento e incluso la muerte.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de sus excipientes.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame, podrá observarse un periodo breve de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- Entre las reacciones adversas sospechosas extremadamente raras, se han descrito reacciones cutáneas transitorias en el punto de aplicación (escamosis, alopecia local, prurito, eritema) y prurito o alopecia general.
- En casos excepcionales, se observaron hipersalivación, signos neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, signos nerviosos), o vómitos después del uso.

Vía de administración

Solo para uso externo. Administración tópica.

Posología

Gatos: Administrar 1 pipeta de 0,5 ml por animal por aplicación tópica en la piel.

- Separar el pelaje del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la pipeta directamente contra la piel exterior y apretar varias veces para vaciar su contenido. Repetir el procedimiento en uno o dos puntos distintos a lo largo del lomo del gato, preferentemente en la base de la cabeza y entre los hombros para que el animal no pueda lamer el producto.

Precauciones especiales

- A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas.
- Lavar con champú una hora antes del tratamiento no afecta a la eficacia del producto frente a las pulgas.
- Para un control óptimo tratar a todos los animales domésticos con un insecticida adecuado.
- No manipular a los animales tratados hasta que el lugar de aplicación esté seco.
- Evitar que el producto entre en contacto con los ojos del animal.
- Lavarse las manos después de su uso.

Modo de conservación

Consérvese a menos de 30 °C y en lugar seco. Guardar en su envase original.

Presentación

Cajas con 4, 24 o 60 pipetas.

Reg. N°

2017 ESP

Imagen

