

# PROFENDER *Spot-on* PARA GATOS

## Antiparasitario interno en pipeta

### Laboratorio

---

BAYER HISPANIA, S.L.

### Forma farmacéutica

---

Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

### Composición por ml:

---

Emodepside 21,4 mg, prazicuantel 85,8 mg, butilhidroxianisol 5,4 mg.

### Propiedades farmacológicas

---

Emodepside actúa en la unión neuromuscular por estimulación de los receptores presinápticos de la familia de receptores de secretina, lo que produce la parálisis y muerte de los parásitos.

Prazicuantel se absorbe con rapidez desde la superficie de los parásitos y actúa produciendo un cambio en la permeabilidad de  $\text{Ca}^{2+}$  de sus membranas, lo que provoca una lesión grave en el tegumento del parásito, contracción, parálisis, la interrupción del metabolismo y finalmente lleva a la muerte del parásito.

### Interacciones e incompatibilidades

---

El tratamiento combinado con otros fármacos sustratos/inhibidores de la glucoproteína P podría originar interacciones farmacocinéticas. Las posibles consecuencias clínicas no se han investigado.

### Indicaciones y especies de destino

---

**Gatos:** Gatos que sufran, o con riesgo de sufrir, infestaciones parasitarias mixtas causadas por fases larvarias y adultas de nematodos (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* y *Ancylostoma tubaeforme*) y fases adultas de cestodos (*Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis* y *Echinococcus multilocularis*).

### Contraindicaciones

---

No utilizar en gatitos menores de 8 semanas o peso inferior a 0,5 kg.

## Efectos secundarios

---

- En muy raras ocasiones, puede producirse salivación y vómitos. Se cree que esto ocurre si el gato lame la zona de aplicación inmediatamente después del tratamiento.
- Muy raramente, se ha observado alopecia pasajera, prurito y/o inflamación en el punto de aplicación después de la administración.

## Vía de administración

---

Tópica.

## Posología

---

**Gatos:** 0,14 ml de Profender/kg.

- Sólo para uso cutáneo. Una sola administración por tratamiento es eficaz.
- Puede utilizarse durante la gestación y lactancia.

## Precauciones especiales

---

- Aplicar sólo sobre piel intacta. Evitar que el gato tratado u otros gatos del mismo hogar laman la zona de aplicación mientras esté todavía húmeda.
- En animales enfermos o debilitados el medicamento debe emplearse únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo.
- Evítese el contacto directo con la zona de aplicación mientras esté húmeda.
- Lávese bien las manos después de su uso.
- En caso de salpicadura accidental sobre la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si es sobre los ojos, éstos deberán enjuagarse bien con agua.
- Mujeres embarazadas o que crean que puedan estarlo deben evitar el contacto con el medicamento o utilizar guantes desechables al aplicarlo.

## Modo de conservación

---

Conservar en el envase original para proteger el medicamento de la humedad.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Envases con 2 o 20 pipetas:

Profender solución para unción dorsal puntual para gatos pequeños ( $\geq 0,5$ -2,5 kg, pipetas con 0,35 ml).

Profender solución para unción dorsal puntual para gatos medianos (>2,5-5 kg, pipetas con 0,70 ml).

Profender solución para unción dorsal puntual para gatos grandes (>5-8 kg, pipetas con 1,12 ml).

**Reg. N°**

---

EU/2/05/054/001-16

**Imagen**

---

