

STRECTIS® 121 mg/60 mg para Gatos 5-10 kg

Antiparasitario externo en solución *spot-on*

Laboratorio

CEVA SALUD ANIMAL

Forma farmacéutica

Pipeta (Pipeta)

Composición por pipeta:

Fipronilo 121 mg; (S)-metopreno 60 mg.

Propiedades farmacológicas

Fipronilo es un insecticida y acaricida que pertenece a la familia de los fenilpirazoles y que actúa por contacto.

(S)-metopreno es un IGR que inhibe el desarrollo de las fases inmaduras de los insectos. Actúa por contacto.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Gatos: Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Rhipicephalus turanicus*).

- La eficacia insecticida frente a pulgas adultas persiste durante 8 semanas. Previene la multiplicación de pulgas por inhibición de la eclosión de los huevos de pulga y del desarrollo de huevos en pulgas adultas durante 6 semanas.
- La eficacia acaricida inmediata frente a garrapatas persiste durante 5 semanas.
- Puede utilizarse como parte del tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).

Contraindicaciones

- En ausencia de datos disponibles, no debe utilizarse en gatitos de menos de 8 semanas de edad o que pesen menos de 1 kg.
- No utilizar en conejos.
- No usar en animales con hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.

Efectos secundarios

- Si el animal se lame la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria debido principalmente a los excipientes del medicamento.
- Pueden producirse efectos cosméticos transitorios como pelos de punta, aspecto húmedo, residuo seco o ligera descamación, en la zona de aplicación. Estos cambios no afectan a la seguridad o eficacia del producto.

Vía de administración

Tópica.

Posología

Gatos: 1 pipeta por animal.

- Puede repetirse cada 5 semanas o según se considere apropiado.
- No repetir a intervalos inferiores de 2 semanas.

Precauciones especiales

- Únicamente para uso externo. No administrar por vía oral.
- Es importante asegurarse de que se aplica en una zona que el animal no puede lamer. No permita que animales recientemente tratados se laman unos a otros.
- Evite el contacto con los ojos del animal. En caso de que entre en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua.
- No aplicar en heridas o lesiones en la piel.

Modo de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Observaciones

Sin prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con 3 pipetas.

Reg. Nº

3181 ESP