

RIMADYL Comprimidos masticables

20 mg/50 mg/100 mg

Antiinflamatorio no esteroideo en comprimido masticable oral

Laboratorio

ZOETIS SPAIN, S.L.U.

Forma farmacéutica

Comprimido masticable (Comp.m.)

Composición por comprimido:

- **Rimadyl Comprimidos Masticables 20 mg:** Carprofeno 20 mg.
- **Rimadyl Comprimidos Masticables 50 mg:** Carprofeno 50 mg.
- **Rimadyl Comprimidos Masticables 100 mg:** Carprofeno 100 mg.

Interacciones e incompatibilidades

No administrar junto a otros AINE, ni con un intervalo entre ellos de menos de 24 horas, puesto que podría aumentar los efectos tóxicos del fármaco.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Disminución de la inflamación y el dolor causados por los desórdenes músculo-esqueléticos, tanto agudos como crónicos, tales como la osteoartritis. Puede también utilizarse en el tratamiento del dolor perioperatorio en histerectomía de ovario e intervenciones auditivas.

Contraindicaciones

- No administrar a perros con alteraciones cardíacas, hepáticas y/o renales; úlceras gastroduodenales; discrasias sanguíneas e hipersensibilidad al carprofeno o a otros derivados del ácido propiónico.
- En ausencia de datos específicos, el empleo de Rimadyl Comprimidos Masticables en gatos está contraindicado.
- No se recomienda su uso en perras gestantes ni en lactación.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros: Una dosis de 4 mg/kg peso corporal/día administrada como dosis única diaria o dividida en dos dosis idénticas (2 mg de carprofeno/kg peso corporal/12 horas). La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. El veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comenzar la terapia.

- Para el control del dolor perioperatorio: 4 mg/kg de peso 2 horas antes de la operación y continuar con el tratamiento antiinflamatorio después de la operación con una dosis de 4 mg/kg peso corporal/día, según se requiera.

Precauciones especiales

- La utilización en animales de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada, puede implicar un riesgo adicional. Si no pueden evitarse dichos tratamientos, requerirán una dosis reducida y un cuidadoso manejo clínico.
- Evitar la utilización en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, dado que existe el riesgo potencial de un aumento en la toxicidad renal.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Rimadyl Comprimidos Masticables 20 mg: 20 comprimidos.
Rimadyl Comprimidos Masticables 50 mg: 20 comprimidos.
Rimadyl Comprimidos Masticables 100 mg: 20 comprimidos.

Reg. Nº

Rimadyl Comprimidos Masticables 20 mg: 1518 ESP
Rimadyl Comprimidos Masticables 50 mg: 1519 ESP
Rimadyl Comprimidos Masticables 100 mg: 1602 ESP