

ENGYSTOL GOTAS ORALES EN SOLUCIÓN

USO VETERINARIO

Medicamento homeopático veterinario sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada g contiene:

Sustancias activas:

Vincetoxicum hirundinaria D6	6 mg
Vincetoxicum hirundinaria D10	6 mg
Vincetoxicum hirundinaria D30	6 mg
Vincetoxicum e cinere D30	1 mg
Sulfur D10	3 mg
Sulfur D4	3 mg

Excipientes:

Etanol 43% (m/m) compuesto de:

Etanol 96% (V/V)

Agua purificada c.s.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino, caprino, equino (caballos, burros), ovino, porcino, conejos.

Perros, gatos, roedores, aves ornamentales.

MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE

Posología:

Dosis individual conforme a especie y tamaño aproximado.

Bovino, equino (caballos, burros):	2 a 3 veces 30 a 40 gotas
Porcino:	2 a 3 veces 20 gotas
Lechones, ovino, caprino:	2 a 3 veces 10 gotas
Perros de gran tamaño:	2 a 3 veces 20 gotas
Perros de tamaño medio:	2 a 3 veces 10 gotas
Perros de pequeño tamaño, gatos:	2 a 3 veces 7 gotas
Roedores, aves ornamentales:	5 gotas

En cuadros en los que sea necesario puede repetirse la dosis recomendada a las 24 horas, durante un máximo de 5 días consecutivos.

En enfermedades crónicas, recidivas y tratamientos prolongados o terapias de soporte, se puede administrar la dosis periódicamente cada 2-4 días.

TIEMPOS DE ESPERA

Bovino, caprino, ovino, equino (caballos), porcino, conejos:

Carne: cero días.

Bovino, caprino, ovino:

Leche: cero horas. **PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar el frasco en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta y caja del envase.

Período de validez después de abierto el envase: 6 meses.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Reacciones adversas:

Pueden producirse agravaciones homeopáticas iniciales que, no obstante, son pasajeras y no revisten mayor importancia.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Advertencias especiales para cada especie de destino:

No procede.

Precauciones especiales de uso:

Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Consulte a su veterinario si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Administrar el medicamento con precaución.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Gestación, lactancia o puesta:

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación, la lactancia o la puesta.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable.

Incompatibilidades:

No procede.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

FORMATOS

Caja de cartón con frasco cuentagotas de 100 ml.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario

Laboratorios Heel España, S.A.U.

Polígono La Mina

Calle Madroño s/n

28770 Colmenar Viejo (Madrid)