


# Dipacxon-39

Cipermetrina 10% (Adulticida)

# Dipacxon D-500

Di-flubenzuron 48% (Larvicida)

AL SERVICIO  
DEL GANADERO



# Dipacxon-39

**Cipermetrina 10%**

**COMPOSICIÓN POR ML:**

Cipermetrina.....100 mg  
Disolvente, c.s.

**INDICACIONES:** Insecticida de uso ganadero.

**ADMINISTRACIÓN:** Pulverización o aspersión.

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** En general usar entre el 0.2% (2 ml / l agua) y el 1% (10 ml / l de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.

**Para insectos voladores:** 10 ml en 5 litros de agua.

**Desinsectación habitual:** 25 ml en 5 litros de agua.

**Infestaciones fuertes:** 50 ml en 5 litros de agua.

**Reaplicaciones:** 10 ml en 5 litros de agua.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se formará una emulsión estable.

Utilizar la mezcla el día de su preparación.

Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

Plazo de seguridad: 24 horas.

# Dipacxon D-500

**Diflubenzuron 48%**

**COMPOSICIÓN POR ML:**

Diflubenzurón .....480 mg  
Excipientes idóneos, c.s.

**INDICACIONES:** Larvicida-ovicida de uso ganadero, para aplicar en locales e instalaciones de explotaciones avícolas y ganaderas (porcino, ovino, bovino, caprino) cunicultura, perreras, zoológicos y otros recintos para animales, fosos de purines, estercoleros, balsas de efluentes y en general en lugares donde se deposite materia orgánica.

**MODO DE APLICACIÓN:** Suspensión concentrada para aplicar diluida en agua. Aplicar el producto directamente sobre la superficie donde se encuentran las larvas.

**DOSIS:** La dosis habitual es de 1 ml de DIPACXON D-500 por cada metro cuadrado de superficie a tratar. Emplear 1-5 L de agua por cada 10 m<sup>2</sup> dependiendo de la instalación. La cantidad de agua es orientativa siempre respetando la dosis de 1 ml / 1 m<sup>2</sup>. Para grandes infestaciones, en naves abiertas y estercoleros, doblar la dosis del producto.

Una vez mezclado debe aplicarse por pulverización sobre las superficies a tratar.



PRODUCTO	APLICACIÓN	DOSIS	MODO EMPLEO	INDICACIÓN	RECOMENDACIONES
<b>Dipacxon-39</b>	Aplicar el producto en todas las superficies de la instalación y en zonas colindantes	2 - 10 ml / litro de agua. Superficie a tratar con cada litro de solución 5 m <sup>2</sup> .	Aplicar las solución preparada por pulverización en todas las superficies a tratar	Fases adultas	En función de las infestaciones. Siempre que se observe presencia de plagas. Como norma general cada 3-6 semanas
<b>Dipacxon D500</b>	Aplicar el producto en todas las superficies de la instalación y en zonas colindantes. Sobre todo en zonas de acumulación de materia orgánica (estercoleros, camas, balsas purines, etc.)	1 ml / m <sup>2</sup> de superficie a tratar. Emplear 1-5 L de agua por cada 10 m <sup>2</sup> dependiendo de la instalación. La cantidad de agua es orientativa siempre respetando la dosis de 1 ml / 1 m <sup>2</sup> . Para grandes infestaciones	Aplicar las solución preparada por pulverización en todas las superficies a tratar	Pupas, larvas y huevos	<b>Primavera:</b> cada 5 semanas <b>Verano:</b> cada 4 semanas <b>Otoño:</b> cada 5 semanas <b>Invierno:</b> cada 10 semanas  La persistencia del producto está directamente relacionada con la acumulación de materia orgánica y los ciclos de limpieza y retirada de la misma