

HYONATE CABALLOS 2 X 2 ML

HYONATE 10 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE Antiinflamatorio y condoprotector en solución inyectable Laboratorio BAYER

Forma farmacéutica: Solución inyectable (Sol.i.)

Composición: por vial:
ácido hialurónico (sal sódica) 18,9 mg.

Propiedades farmacológicas: El ácido hialurónico es un componente del tejido conjuntivo de todos los mamíferos y se encuentra ampliamente distribuido en los tejidos corporales y en los fluidos intracelulares. El la articulación sana, el hialuronato sódico es sintetizado en los sinoviocitos.

Interacciones e incompatibilidades: Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino: Equino: Tratamiento de la sinovitis no infecciosa de las articulaciones del carpo, el corvejón y el menudillo en el caballo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al hialuronato sódico administrado de forma exógena.

Efectos secundarios: Ocasionalmente, después de la aplicación intraarticular puede aparecer una reacción de la articulación (inflamación, sensibilidad, cojera) que en la mayoría de los casos desaparece espontáneamente al cabo de unos días.

Vía de administración: Solución inyectable para uso intravenoso o intraarticular.

Posología: Équidos: La dosis recomendada es:

- Intravenosa: 4 ml (correspondiente a 40 mg de principio activo)
- Intraarticular: 2 ml (correspondiente a 20 mg de principio activo) Tres tratamientos a intervalos semanales. Si se observa una rápida mejoría, puede requerirse un menor número de tratamientos.

Precauciones especiales:

- Este producto no contiene conservante antimicrobiano. Desechar cualquier fracción de medicamento no utilizado y el vial vacío después de usar el producto.
- Debe observarse una técnica aséptica estricta al inyectar Hyonate para Caballos. Al igual que con cualquier otro tratamiento intraarticular, es importante inmovilizar al animal y desinfectar adecuadamente la zona de punción. Antes de la inyección se debe retirar asépticamente el exceso de líquido sinovial. Debe evitarse raspar la superficie del cartilago con la punta de la aguja de inyección. Para obtener los mejores resultados, el caballo debe permanecer 3 días en reposo después del tratamiento intraarticular y antes de reanudar gradualmente su actividad normal.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. Las personas con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico deberán evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Tiempo de espera: No precisa.

Modo de conservación: Conservar a menos de 25 °C y protegido de la luz solar.

Observaciones: Con prescripción veterinaria.

Presentación : Estuche con 2 viales de vidrio conteniendo 2 ml de solución inyectable cada uno.

Reg. Nº: 1.218-ESP