

SCALIBOR COLLAR

SCALIBOR® COLLAR Antiparasitario externo en collar

Laboratorio INTERVET SCHERING PLOUGH ANIMAL HEALTH

Forma farmacéutica: Collar (Collar)

Composición: por collar:

Sustancia activa: Deltametrina 40 mg/g.

Interacciones e incompatibilidades: Se ha descrito reacción con insecticidas organofosforados.



Indicaciones y especies de destino: Perros: Prevención de las infestaciones por garrapatas y pulgas durante 6 y 4 meses, respectivamente.

Scalibor® collar tiene un efecto repelente (antialimentación) para los *Phlebotomus* spp., por lo que puede utilizarse como parte de un programa de prevención frente a la leishmaniosis, y para los mosquitos culícidos del complejo *Culex pipiens*.

Contraindicaciones: No procede.

Efectos secundarios:

- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales de cada 10000), se han observado reacciones alérgicas locales (prurito, enrojecimiento de la piel, pérdida de pelo) de carácter leve.
- También pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad general. Los síntomas son reversibles una vez se ha retirado el collar.
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales de cada 10000), se han observado problemas neuromusculares tales como: hiperactividad, ataxia y temblor muscular.

Vía de administración: Uso externo.

Posología: 1 collar/animal.

- Ajustar el collar, sin apretar, alrededor del cuello del animal. Cortar el exceso de collar, dejando 5 cm tras el pasador.

No se han observado efectos secundarios en perras gestantes que llevaron el collar durante la gestación y el periodo de lactación, ni en cachorros de madres tratadas hasta el destete.

Precauciones especiales:

- No utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas.
- No usar en animales menores de 7 semanas de edad.
- El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación en el perro.
- Lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar.
- Mantener lejos de bebidas, alimentos y pienso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen.
- Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo.
- En caso de ingestión accidental del collar, podrían observarse pérdida de coordinación de los movimientos, temblor, hipersalivación. Estos síntomas son reversibles dentro de las primeras 48 horas. Antídoto: diazepam.
- La deltametrina es tóxica para los peces y las abejas. Después de usar el collar no debe tirarse en el medio ambiente ni en el agua.

Tiempo de espera: No procede.

Modo de conservación: Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Observaciones:

- Uso veterinario.
- Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Presentación :

- **Caja con collar de 48 cm.**

- **Caja con collar de 65 cm.**

Reg. Nº: 1326 ESP