

# INSECTICIDAS de uso ganadero

## DIPACXON-39

Insecticida contra insectos voladores y rastreros

### COMPOSICIÓN POR ml:

Cipermetrina.....100 mg  
Excipientes idóneos, c.s.



**CARACTERÍSTICAS:** El insecticida líquido autoemulsionable **DIPACXON-39** está indicado para combatir prácticamente la totalidad de los insectos que causan problemas en la higiene del ámbito zoonosanitario, tales como **cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, piojos, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas, antrenos, carcomas, etc, así como casi todas las especies de ácaros.**

Actúa por contacto y por ingestión. Se absorbe rápidamente a través de la cutícula, por la gran afinidad que el producto tiene sobre los artrópodos, proporcionando un elevado efecto de choque, debido a lo cual los insectos son abatidos de forma inmediata.

### Plazo de seguridad recomendado:

Esperar 24-48h antes de introducir los animales en las instalaciones tratadas.

### INDICACIONES:

**Instalaciones ganaderas** (rejillas, suelos, fosas, rincones con excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de bordes donde queden restos de pienso y deyecciones).

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

En general usar entre el 0.2% (2 ml / 1 L agua) y el 1% (10 ml / L de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.

La dosificación por 100 m<sup>2</sup> es:

**Para insectos voladores:** 10 ml en 5 litros de agua.

**Desinsectación habitual:** 25 ml en 5 litros de agua.


**Infestaciones fuertes:** 50 ml en 5 litros de agua.

**Reaplicaciones:** 10 ml en 5 litros de agua.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se formará una emulsión estable. Utilizar la mezcla el día de su preparación.

Aplicar en ausencia de animales.

### PRESENTACIONES:



Nº Registro: 5583

Insecticida de uso ganadero

# DIPACXON-39

Insecticida contra insectos voladores y rastreros

## Composición por ml:

Cipermetrina ..... 100 mg

Excipientes idóneos, c.s.



## Características:

El insecticida líquido autoemulsionable **DIPACXON-39** está indicado para combatir prácticamente la totalidad de los insectos que causan problemas en la higiene del ámbito zosanitario, tales como **cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, piojos, lepismas, avispas, tábanos, tijeretitas, antrenos, carcomas, etc, así como casi todas las especies de ácaros.**

Actúa por contacto y por ingestión. Se absorbe rápidamente a través de la cutícula, por la gran afinidad que el producto tiene sobre los artrópodos, proporcionando un elevado efecto de choque, debido a lo cual los insectos son abatidos de forma inmediata.

## Plazo de seguridad recomendado:

Esperar 1 día antes de introducir los animales en las instalaciones tratadas.

## Indicaciones:

Instalaciones ganaderos (rejillas, suelos, fosas, rincones con excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de bordes donde queden restos de pienso y deyecciones)

## Dosificación y modo de empleo:

En general usar entre el 0.2% (2 ml / l agua) y el 1% (10 ml / l de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y condiciones climáticas.

La dosificación por 100 m<sup>2</sup> es:

**Para insectos voladores:** 10 ml en 5 litros de agua.

**Desinsectación habitual:** 25 ml en 5 litros de agua.

**Infestaciones fuertes:** 50 ml en 5 litros de agua.

**Reaplicaciones:** 10 ml en 5 litros de agua.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y sin agitar se formará una emulsión estable. Utilizar la mezcla el día de su preparación.

Aplicar en ausencia de animales

## Presentaciones:

250 ml, 500ml, 1l, 5 l.

**Nº Registro:** 5583



C. dels Boters, s/n. • Pol. Ind. Mas Ferrer • 43205 REUS (SPAIN) • Tel. 34 977 757 273 • Fax 34 977 751 398

[cenavisa.com](http://cenavisa.com)