

ADVOCATE *Spot-on* PARA PERROS

Antiparasitario externo
en solución *spot-on*

Laboratorio

BAYER HISPANIA, S.L.

Forma farmacéutica

Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

Composición por pipeta:

Imidacloprid 10% y moxidectina 2,5%. Butilhidroxitolueno.

Propiedades farmacológicas

Imidacloprid es un ectoparasiticida del grupo cloronicotinílico eficaz frente a las fases larvarias de la pulga y las pulgas adultas que presenta una actividad farmacológica mínima en mamíferos. Se distribuye rápidamente sobre la piel del animal en el primer día de aplicación.

Moxidectina es un parasiticida de la familia de la milbemicina (lactona macrocíclica) activo frente a gran número de parásitos internos y externos, frente a las fases larvarias (L3, L4) de *Dirofilaria immitis* y frente a los nematodos gastrointestinales. Se absorbe a través de la piel y se distribuye por vía sistémica alcanzando unas concentraciones plasmáticas máximas aproximadamente de 4 a 9 días en perros. Se elimina lentamente del plasma.

Interacciones e incompatibilidades

Durante el tratamiento con Advocate no debe administrarse ningún otro antiparasitario del tipo lactona macrocíclica.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*), tratamiento de infestación por ácaros de los oídos (*Otodectes cynotis*). Prevención de la filariosis (larvas L3/L4 de *Dirofilaria immitis*) y de la angiostrongilosis (larvas L4 y adultos inmaduros de *Angiostrongylus vasorum*). Tratamiento de las infecciones por nematodos gastrointestinales (larvas L4, adultos inmaduros y adultos de *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* y *Uncinaria stenocephala*, adultos de *Toxascaris leonina* y *Trichuris vulpis*). Tratamiento de la infestación por piojos masticadores (*Trichodectes canis*), sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*), demodicosis (*Demodex canis*) e infecciones por *Angiostrongylus vasorum* y *Crenosoma vulpis*.

Contraindicaciones

- No utilizar en cachorros de menos de 7 semanas.
- No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o alguno de los excipientes.

Efectos secundarios

Advocate puede originar un prurito pasajero en el perro.

En raras ocasiones, puede producirse grasa en el pelo, eritema y vómitos. Estos síntomas remiten sin tratamiento.

En raras ocasiones, se pueden dar reacciones locales de hipersensibilidad.

Si el animal lame la zona de aplicación después del tratamiento, rara vez pueden observarse signos neurológicos pasajeros.

El medicamento tiene un sabor amargo y si el animal lo lame puede producir salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece al cabo de unos minutos sin tratamiento.

Muy raras veces, el medicamento puede dar lugar en el punto de aplicación a una sensación que origine alteraciones pasajeras del comportamiento como letargia, agitación o inapetencia.

Vía de administración

Tópica.

Posología

Perros: La dosis mínima recomendada es de 0,1 ml de Advocate para perros/kg. Debe aplicarse todo el contenido de la pipeta.

- Tratamiento y prevención de infestación por pulgas: Una vez al mes.
 - Tratamiento de la infestación por piojos masticadores: Una sola dosis.
 - Prevención de la dirofilariosis: Una vez al mes.
 - Tratamiento de infestación por ácaros de los oídos: Una sola dosis.
 - Tratamiento de la sarna sarcóptica: Una sola dosis dos veces, con un intervalo de 4 semanas.
 - Tratamiento de la demodicosis: Una sola dosis cada 4 semanas durante un periodo de 2 a 4 meses.
- En casos graves, puede requerirse un tratamiento más frecuente y prolongado.
- Tratamiento y prevención de la infección por *Angiostrongylus vasorum*: Una sola dosis.
 - Tratamiento de la infección por *Crenosoma vulpis*: Una sola dosis.
 - Tratamiento de las infecciones por ascáridos, ancilostomas y tricúridos: Una vez al mes.

Precauciones especiales

Para los animales:

- El tratamiento de perros que pesen menos de 1 kg, así como de animales enfermos o débiles debe basarse en la evaluación del beneficio/riesgo del veterinario. Asimismo, para el uso en la gestación y lactancia.
- Debe evitarse que el contenido de la pipeta o la dosis aplicada entre en contacto con los ojos o la boca del animal receptor y/u otros animales. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.
- En perros de razas Collie, Bobtail y relacionadas o sus cruces, debido a la moxidectina, se tendrá un cuidado especial en la administración correcta del medicamento.
- Se evitará la ingestión oral por parte del animal receptor y/o de otros animales que estén en contacto.

Para la persona que administra el medicamento:

- Evítese el contacto con la piel, los ojos y la boca.
- No coma, beba ni fume durante la aplicación.
- Lávese bien las manos después de usar el medicamento.
- Tras la aplicación del medicamento no acariciar ni asear a los animales hasta que el lugar de aplicación esté seco.
- En caso de salpicadura accidental sobre la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si es sobre los ojos, éstos deberán enjuagarse bien con agua.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a algún componente deben aplicar el medicamento con precaución.
- En muy raros casos, el medicamento puede producir sensibilización cutánea o reacciones cutáneas pasajeras (p. ej. alergia, irritación u hormigueo). Si los síntomas cutáneos u oculares persisten o en caso de ingestión accidental del medicamento, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto.

Modo de conservación

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 3 pipetas:

Advocate para Perros pequeños 3 × 0,4 ml (≤ 4 kg).

Advocate para Perros medianos 3 × 1,0 ml ($> 4 - 10$ kg).

Advocate para Perros grandes 3 × 2,5 ml ($> 10 - 25$ kg).

Advocate para Perros muy grandes 3 × 4,0 ml ($> 25 - 40$ kg).

Envase con 21 pipetas:

Advocate para perros pequeños 21 × 0,4 ml (≤ 4 kg).

Advocate para perros medianos 21 × 1,0 ml ($> 4 - 10$ kg).

Reg. Nº

EU/2/03/039/005
EU/2/03/039/007
EU/2/03/039/009
EU/2/03/039/011
EU/2/03/039/021
EU/2/03/039/025

Imagen

