ADVANTAGE 400 PARA PERROS

Antiparasitario para tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas en perros

Laboratorio

ESTEVE

Forma farmacéutica

Pipeta (Pipeta)

Composición por pipeta:

Cada pipeta contiene solución de imidacloprid al 10%.

Propiedades farmacológicas

Imidacloprid posee una elevada afinidad por los receptores postsinápticos nicotínicos de la acetilcolina en los insectos.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Perros de más de 25 kg:

- Para prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas. Un tratamiento previene una posterior infestación por pulgas durante 4 semanas.
- Para el tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores.
- El producto puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).
- Puede utilizarse en hembras en periodo de gestación o lactancia.

Contraindicaciones

- No tratar a cachorros no destetados de menos de 8 semanas de edad.
- No usar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto.

Efectos secundarios

- Si el animal lame el producto, su sabor amargo puede producir salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece en unos minutos.
- En muy raras ocasiones, pueden producirse reacciones cutáneas tales como pérdida de pelo, enrojecimiento, picores y lesiones en la piel. También se ha notificado agitación y desorientación. Excepcionalmente, se ha notificado salivación excesiva y signos nerviosos tales como descoordinación, temblor y depresión.

Vía de administración

Tópica.

Posología

Administrar 1 pipeta de 4 ml cada mes.

- Para perros entre 25 kg y 40 kg de peso. Aplicar una pipeta separando el pelo del animal, repartida uniformemente en 3 o 4 puntos sobre la línea dorsal del animal desde la zona escapular hasta la base de la cola.
- Para perros de peso 40 kg o superior se emplean 2 pipetas.
- Aplicar únicamente sobre piel sana. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.

Precauciones especiales

- Lavarse las manos después de su uso.
- Evitar el contacto del contenido del producto con los ojos o la boca del animal.

Observaciones

Sin prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con 4 pipetas monodosis de 4 ml.

Reg. Nº

1.270-ESP