

ADAPTIL® Collar

Feromona de apaciguamiento canino

en collar

Laboratorio

CEVA SALUD ANIMAL

Forma farmacéutica

Collar (Collar)

Composición por collar:

Feromona sintética del apaciguamiento canino 2,5%.

Propiedades farmacológicas

Las hembras de los mamíferos, durante la lactación secretan unas sustancias denominadas "feromonas de apaciguamiento" cuya función es el mantener a la camada unida y transmitir tranquilidad y seguridad.

La feromona de apaciguamiento canino se secreta en las glándulas sebáceas del surco intermamario de la hembra en lactación.

Estas feromonas ayudan a que el cachorro esté tranquilo y le proporcionan seguridad, particularmente en entornos desconocidos y cuando debe afrontar nuevas experiencias.

Diversas investigaciones han demostrado la capacidad para proporcionar seguridad de las feromonas de apaciguamiento en perros de todas las edades.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Adaptil® Collar ayudará a controlar o prevenir los signos de miedo en cachorros y perros adultos. Puede utilizarse cuando se produzcan situaciones que lo requieran, tanto dentro como fuera de la casa, tales como:

- Adaptación a un nuevo entorno (una casa nueva, extraños, estancias en una residencia, etc.).
- Periodo de socialización.
- Situaciones nuevas e impredecibles.
- Reacciones de miedo que se manifiestan fuera del hogar (tráfico, otros perros, truenos, cohetes, etc.).

Adaptil® Collar no está recomendado en casos de hiperactividad o agresividad.

Posología

- Ajuste el collar alrededor del cuello del perro y fije el cierre.
- Corte el collar sobrante.

- Mantenga siempre el collar alrededor del cuello del perro y en contacto con su piel.
- El collar es eficaz durante cuatro semanas.
- Para facilitar la adaptación de un cachorro, debe mantenerlo durante un periodo suficiente como para que le permita un adecuado conocimiento del nuevo entorno y las nuevas costumbres, así como durante el periodo de socialización.

Recomendaciones de uso:

| Situación | Recomendación de uso |
|--|--|
| Adaptación a un nuevo entorno | 1 mes como mínimo |
| Periodo de socialización | 2 meses como mínimo |
| Miedo fuera de casa (tráfico, otros perros, tormentas, petardos, etc.) | Dependerá de la causa y su gravedad. Se puede combinar con terapia de modificación de conducta. La duración la ajustará el terapeuta según la evolución del animal. |
| Miedos con una causa tanto en casa como fuera de ella | Dependerá de la causa y su gravedad. Se puede combinar con terapia de modificación de conducta. La duración la ajustará el terapeuta según la evolución del animal. Para el resultado óptimo se puede combinar con el uso de Adaptil® Difusor. |
| Bienestar | Los perros que no están en contacto frecuente con otros, pueden beneficiarse del uso de Adaptil® de una forma continuada. |

Precauciones especiales

- Quite el collar antes de bañarlo y vuelva a colocarlo cuando el pelo del perro esté seco.
- No utilice el collar en perros con lesiones de piel extensas.
- No abra la bolsa protectora hasta que no vaya a utilizar el collar.

Presentación

Collar de 70 cm.
Collar de 45 cm.

Reg. Nº

No precisa

Imagen

