

EXSPOT 6 AMPOLLAS

EXSPOT™ Solución para unción dorsal puntual. Blísteres de 6 pipetas de 1 ml o 2 ml.

Insecticida de uso exclusivo en perros Laboratorio MSD

Forma farmacéutica: Solución tópica (Sol.t.)

Composición: por ml: Permetrina (40:60) 718 mg; excipiente c.s.p. 1 ml.

Interacciones e incompatibilidades: No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino: Perros: Tratamiento y control de las parasitosis externas producidas por pulgas, garrapatas y piojos y como ayuda en el control de mosquitos del perro.

Efecto repelente e insecticida frente a flebotomos.

Contraindicaciones:

- No usar en gatos. La administración a gatos puede originar la aparición de reacciones adversas graves que, en ocasiones, pueden causar la muerte.
- No usar en perros de menos de 2 semanas de edad.
- No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o excipientes.

Efectos secundarios: Los perros pueden presentar letargia, prurito, eritema, exantema y pérdida del pelo en el punto de aplicación. Se han descrito excepcionalmente casos de reacciones de sensibilidad dérmica. Si surgiera, suspender el tratamiento, bañar al animal y acudir al veterinario.

Vía de administración: Unción dorsal puntual (tópica).

Posología: Ampolla monodosis de 1 ml o 2 ml según peso.

Perros de peso inferior a 15 kg: Aplicar 1 ml en la cruz.

Perros de peso superior a 15 kg: Aplicar 2 ml, uno en la cruz y el segundo en la base de la cola.

- Separar el pelo del animal y aplicar el producto directamente sobre la piel. Para información detallada, consultar prospecto.
- El intervalo entre tratamientos dependerá de la intensidad de la infestación. Las pruebas de campo realizadas indican un período de protección de cuatro semanas tras la aplicación del producto.
- Un tratamiento proporciona efecto repelente por dos semanas y como insecticida de una semana frente a flebotomos.
- En aquellas ocasiones en las que el perro tratado se moje ampliamente (por ejemplo, debido a que fuera lavado con champú, etc.), el período de protección puede reducirse. El producto puede aplicarse con seguridad a intervalos no inferiores a siete días.

Precauciones especiales:

- Dado que puede darse la posibilidad de que algún flebotomo pique al animal, no se puede excluir completamente la transmisión de enfermedades si las condiciones son desfavorables.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos; si esto ocurriera, lavar inmediatamente con abundante agua.
- Mantener alejado de alimentos, bebidas y pienso.
- Exspot no se deberá verter en cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.
- Sólo para uso externo.

Tiempo de espera: No procede.

Modo de conservación: Conservar a temperatura inferior a 25 °C. No refrigerar. Proteger de la luz.

Observaciones:

- Uso veterinario. Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.
- Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Presentación : Blísteres de 6 pipetas de 1 ml o 2 ml.

Reg. N°: 1.191 ESP