

BOLFO COLLAR GATOS

BOLFO COLLAR Insecticida en collar Laboratorio BAYER

Forma farmacéutica: Collar (Collar)

Composición: por 100 g:
Propoxur 9,87 g.

Propiedades farmacológicas: Ectoparasiticida del grupo de los carbamatos.

Interacciones e incompatibilidades:

- No administrar conjuntamente con otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, ni inhibidores del SNC, ni con relajantes musculares.
- No utilizar conjuntamente jabones o detergentes de pH alcalino.

Indicaciones y especies de destino: Perros y Gatos: Para el control de las infestaciones por moscas, garrapatas, pulgas y piojos.

Contraindicaciones:

- No usar en animales enfermos o convalescientes.
- No usar en caso de hipersensibilidad a los anticolinesterásicos.
- No usar en gatos menores de 6 semanas ni en perros menores de 3 meses.
- No usar en animales sometidos a una terapia tópica con corticosteroides.

Efectos secundarios: Ocasionalmente, reacciones de hipersensibilidad cutánea alrededor del cuello que desaparecen al quitar el collar.

Vía de administración: Colocar el collar alrededor del cuello del animal a tratar.

Posología: Perros y Gatos: 1 collar/animal.

Precauciones especiales:

- Para el perfecto control de los parásitos, además del uso del collar debe tratarse el entorno del animal.
- Los collares pueden perder actividad en contacto prolongado con el agua. Quitar el collar al bañar al animal, colocándolo de nuevo cuando el pelo esté seco.
- No abrir la bolsa protectora que contiene el collar hasta el momento de su utilización.

Tiempo de espera: No procede.

Presentación : Cajas con: 1 collar para perros grandes; 1 collar para perros pequeños; y 1 collar para gatos.

Reg. Nº: 0216-ESP