

# FLEVOX PERRO PIPETAS

FLEVOX FLEVOX 50 mg Solución para Unción Dorsal Puntual para Gatos FLEVOX 67 mg Solución para Unción Dorsal Puntual para Perros Pequeños FLEVOX 134 mg Solución para Unción Dorsal Puntual para Perros Medianos FLEVOX 268 mg Solución para Unción Dorsal Puntual para Perros Grandes FLEVOX 402 mg Solución para Unción Dorsal Puntual para Perros muy Grandes  
Laboratorio VÉTOQUINOL E.V.S.A .

Forma farmacéutica: Solución para unción dorsal puntual (Sol. u. d. p.)

Composición: por pipeta:

FLEVOX 50 mg una pipeta contiene: fipronilo 50 mg.

FLEVOX 67 mg una pipeta contiene: fipronilo 67 mg.

FLEVOX 134 mg una pipeta contiene: fipronilo 134 mg.

FLEVOX 268 mg una pipeta contiene: fipronilo 286 mg.

FLEVOX 402 mg una pipeta contiene: fipronilo 402 mg.



Interacciones e incompatibilidades:

- Los animales deben pesarse de forma precisa antes del tratamiento.
- Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, lavase inmediatamente con abundante agua.
- No aplique el medicamento en heridas o piel dañada.
- No se han realizados estudios de investigación específicos sobre la seguridad del medicamento a dosis repetidas, debido a que el perfil de seguridad de la sustancia activa y de los excipientes es conocido.

Indicaciones y especies de destino: Gatos: Tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante cuatro semanas. Las nuevas pulgas que llegan mueren dentro de las 48 horas de posarse en el animal. El medicamento puede ser usado como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), cuando haya sido previamente diagnosticada por un veterinario.

El medicamento tiene una eficacia acaricida que persiste hasta una semana frente a garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor reticulatus*). Si las garrapatas de *Dermacentor reticulatus* están presentes cuando el medicamento es aplicado, puede que todas las garrapatas no sean eliminadas en las primeras 48 horas, pero se eliminarán en una semana.

Perros: Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp.*) y piojos masticadores/chupadores (*Trichodectes canis*) en perros.

La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante ocho semanas. Las nuevas pulgas que llegan mueren dentro de las 48 horas de posarse en el animal. El medicamento puede ser usado como parte de una estrategia de tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), cuando haya sido previamente diagnosticada por un veterinario.

El medicamento no ha demostrado un efecto acaricida inmediato frente a garrapatas pero ha demostrado una eficacia acaricida persistente de hasta cuatro semanas contra *Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor reticulatus* y de hasta tres semanas contra *Ixodes ricinus*. Si las garrapatas de estas especies están presentes cuando el medicamento es aplicado, puede que todas las garrapatas no sean eliminadas en las primeras 48 horas, pero se eliminarán en una semana.

Contraindicaciones:

- En ausencia de datos disponibles, el medicamento no debe utilizarse en gatitos de menos de ocho semanas de edad y/o que pesen menos de 1 kg, ni en perros cachorros de menos de ocho semanas de edad y/o que pesen menos de 2 kg.
- No utilizar en animales enfermos (p.ej. enfermedad sistémica, fiebre, etc.) o convalecientes.
- No utilizar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas incluso con resultado de muerte.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad a fipronilo o alguno de los excipientes.
- No administrar oralmente.

Precauciones especiales:

- Este medicamento puede causar irritación en la membrana mucosa y en los ojos. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del medicamento con la boca y los ojos.
- En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto.
- Evitar el contacto del medicamento con los dedos. Si esto ocurre, lavarse las manos con jabón y agua. Lavarse las manos después de su uso.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.
- Las personas con hipersensibilidad conocida a fipronilo o a algunos de los excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento.
- Los animales tratados no deben ser tocados hasta que el punto de aplicación del medicamento esté seco, y no se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación este seco. Por lo tanto se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino tratarlos al atardecer, y que los animales recientemente tratados no duerman con los dueños, especialmente con los niños.

**Presentación :**

**FLEVOX 50 mg: 1 x 10 pipetas. Envase de 36 pipetas.**

**FLEVOX 67 mg: 1 x 10 pipetas. Envase de 36 pipetas.**

**FLEVOX 134 mg: 1 x 10 pipetas. Envase de 36 pipetas.**

**FLEVOX 268 mg: 1 x 10 pipetas. Envase de 36 pipetas.**

**FLEVOX 402 mg: 1 x 10 pipetas. Envase de 36 pipetas.**

Reg. Nº: FLEVOX 50 mg: 2304 ESP FLEVOX 67 mg : 2305 ESP FLEVOX 134 mg: 2306 ESP FLEVOX 268 mg: 2307 ESP FLEVOX 402 mg: 2308 ESP